

CHEROKEE»»54F®

fungicida

suspensión concentrada

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
Tebuconazole	15,2 %	180 g/L
Carbendazim	30,4 %	360 g/L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Triazol + bencimidazol

Clasificación Toxicológica: III Tres

Antídotos: No tiene.

Primeros auxilios: Consultar inmediatamente a un médico. En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. Concurrir al médico llevando la etiqueta o envase de este producto.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CII TELEF: 1722

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros. Evite el contacto con la piel y los ojos, no inhalar. No comer, beber o fumar mientras esté en contacto con este producto. Inmediatamente después de realizar las aplicaciones, cambiar la ropa de trabajo y aseo cuidadosamente con agua y jabón. Lave también la ropa de trabajo. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. Conservar el producto en su envase original.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar gafas, guantes, botas de goma, ropa protectora adecuada.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico

Toxicidad para abejas: moderadamente tóxico

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido remanente en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Instrucciones de almacenamiento. Mantener en su envase original, cerrado, debidamente etiquetado, en lugar fresco, seco alejado del sol y la luz. Revisar el vencimiento del producto. Aislar e identificar el depósito. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P. Registro N° 3496



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001
E-mail: cibeles@cibeles.com.uy
Montevideo • Uruguay

Formulado en Uruguay por:
Cia. Cibeles S.A.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

CHEROKEE 54 F es un fungicida formado por la combinación balanceada de dos ingredientes activos de acción complementaria: un triazol, el tebuconazol y un bencimidazol, el carbendazim. Actúa en forma sistémica, protegiendo la planta desde el interior por sistemía apical, alcanzando hojas, tallos y todas las partes verdes de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis L/ha	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Cebada	Fusariosis de la espiga	<i>Fusarium graminearum</i>	1 L / ha	Aplicar desde embuchado a inicios de floración.
Trigo	Roya de la hoja	<i>Puccinia recondita</i>	0,75 L / ha	A la aparición de las primeras pústulas o al inicio de la extensión de la hoja bandera. Aplicar preventivamente a inicio de floración,
	Septoriosis	<i>Septoria tritici</i>		
	Golpe blanco	<i>Fusarium graminearum</i>	1 L / ha	
Soja	Roya	<i>Phakopsora pachyrhisi</i>	0,75 L / ha	
	Enfermedades del fin de ciclo	<i>Septoria glycines</i> <i>Cercospora kikuchii</i>	0,75 L / ha	

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Se realiza una aplicación en el momento indicado y si fuere necesario se debe repetir el tratamiento a los 15-20 días.

Compatibilidad y fitotoxicidad: **CHEROKEE 54 F** no debe mezclarse con productos fuertemente ácidos o alcalinos.

Tiempo de espera: 35 días

Tiempo de reingreso al cultivo: Se establece un tiempo de reingreso mínimo al cultivo de 24 horas luego del tratamiento.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Agitar el envase antes de usar. Colocar un poco de agua en el tanque con el agitador en marcha, agregar la dosis necesaria de **CHEROKEE 54 F** y completar el tanque con agua. Continuar agitando la mezcla. **CHEROKEE 54 F** puede utilizarse en aplicaciones terrestres o aéreas, y se recomienda no utilizar un volumen de agua menor a 200 L / ha y 40 L/ha respectivamente. No debe de aplicarse en días con mucho viento, temperaturas muy altas o humedad relativa muy baja. No realice aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos a menos de 300 metros de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado, en el caso de aplicaciones aéreas esta distancia no debe ser menor a 500 metros. Una vez finalizada la aplicación lave el tanque con agua y jabón, evitando derramar el agua de lavado sobre fuentes de agua. Utilice protección adecuada para todas estas labores.

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

