

Fungicida



emulsión aceite en agua

Porcentaje en peso(p/p)

Contenido en volumen(l/50)

Tebuconazol 23, 1 %250 g/L

Precauciones y Advertencias: Grupo químico: Triazol

Clasificación Toxicológica: Poco peligroso en el uso normal. (IPCS/OMS 2006).

Antídotos: No tiene. **Medidas a tomar como primeros auxilios:** En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavar con agua durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel: quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. **En caso de intoxicación llamar al CIAT Tel: 1722. Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.**

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego

de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.** No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Ligeramente tóxico para aves y abejas. Moderadamente tóxico para peces. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfere el envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. El local debe estar claramente señalizado.

Generalidades modo de acción sobre la enfermedad o el cultivo e instrucciones para su uso:

BUCANER 25 EW es una formulación basada en la emulsión de tebuconazole disuelto en finas gotas de aceite incorporadas a una base acuosa. Esto le otorga un mayor poder de adhesión a la capa foliar permitiendo un adecuado control de las enfermedades indicadas en esta etiqueta. BUCANER 25 EW es rápidamente absorbido por las partes vegetativas y trasladado en forma ascendente a otros sitios de la planta.

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis cc/há	Epocas de aplicación
Arroz	Podredumbre del tallo	Sclerotium oryzae	500	A la emergencia de la panoja y 15 días después.
	Manchado confluyente	Rhizoctonia oryzae sativae		
Trigo	Roya de la hoja	Puccinia recondita	700	Cuando se observen los primeros síntomas o durante el periodo crítico que va desde el embeche hasta la espigazón para proteger la hoja bandera.
	Septoriosis	Septoria tritici		
Cebada	Golpe blanco	Fusarium graminearum	800 a 1000	Durante la floración del cultivo solo o en mezcla con Gbencarb 5000.
	Roya de la hoja	Puccinia hordei		
Soja	Mancha en red	Drechslera teres	500	A la aparición de las primeras pústulas o al inicio de la extensión de la hoja bandera. En caso que los síntomas se presenten antes realizar una aplicación a la aparición de los mismos.
	Roya asiática	Phakopsora pachrysi		

Número, frecuencia, ó espaciamento de aplicaciones si corresponde: Las aplicaciones se realizan en el momento indicado y si fuere necesario se debe repetir el tratamiento a los 15 días.

Compatibilidad y Fitotoxicidad: No es aconsejable mezclar BUCANER 25EW con otros productos, principalmente concentrados emulsionables. Incompatible con productos de reacción alcalina.

Tiempo de espera: Cebada, trigo, arroz: 35 días. Soja: 21 días

Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.

Modo de preparación técnica de aplicación: Agitar el envase, colocar un poco de agua en el tanque de la pulverizadora, agregar la dosis necesaria de BUCANER 25 EW, agitar, completar el volumen de agua y mantener la agitación. BUCANER 25EW se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto

comercial por unidad de superficie. "No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 mt de cualquier zona urbana sub urbana y centro poblado". Prohibido aplicar en forma aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 mt de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes de agua superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 mt del limite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. Prohibido aplicar con maquinarias terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mt de cualquier corriente natural de agua. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 mts del limite del predio de escuelas rurales. Prohibido llenar con agua las maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P. Registro Nº 2871

Contenido Neto **20L**



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 - Cíel.: 2209 1001
Montevideo - Uruguay



Formulado en Uruguay por: Cia. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



Impreso por: Matini/Asistec

10:56