

Daminé cib 60

Herbicida

concentrado soluble

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
2,4-D, sal amina:.....	50,8%.....	600 g/L
2,4-D ácido	42,4%.....	500 g/L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: ACIDO FENOXICARBOXILICO.

Clasificación toxicológica: Clase II (dos)

Moderadamente peligroso IPCS/OMS 2004.

Antídotos: No tiene antídoto.

Medidas a tomar como primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vomito. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la zona afectada con abundante agua. Contacto con los ojos: lavado con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, e instrucciones de manejo de envases: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No

pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves, peces y abejas:

Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

Toxicidad para peces: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P.
Registro N° 2762



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.

12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001

E-mail: cibeles@cibeles.com.uy

Montevideo • Uruguay

Formulado en Uruguay por:

Cia. Cibeles S.A.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Generalidades e instrucciones para su uso: DAMINÉ 60 Cib es un herbicida concentrado, post emergente, sistémico y selectivo para el control de hojar ancha en cultivos de gramíneas. DAMINÉ 60 Cib penetra a través de hojas y tallos y se trasloca a toda la planta. DAMINÉ 60 Cib no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 12°C pues la acción del producto se entorpece con el frío. Los mejores resultados se obtienen con días claros, soleados temperaturas superiores a 15°C y sin viento, con buena humedad en el suelo y activo crecimiento de las malezas. **Epoas de aplicación:** Trigo, cebada, arroz, avena, desde macollaje a comienzo de encañado. Maíz y sorgo con plantas de hasta 15 cm. de altura, pulverización total, con plantas más grandes pulverización dirigida usando caños de bajada al entresurco. Caña de Azúcar en pre-emergencia o en post emergencia pero luego que las plantas tengan mas de 20 cm de altura.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga, enfermedad o maleza	
	Nombre común	Nombre científico
Trigo	Yuyo colorado	Amaranthus spp
Cebada	Verdolaga	Portulaca oleracea
Avena	Cepa caballo	Xanthium spinosum
Arroz	Chamico	Datura ferox
Alpiste	Diente de León	Taraxacum officinale
Raigras	Mostacilla	Rapistrum rugosum
Maíz	Nabo	Brassica campestris
Sorgo	Abrojo	Xanthium cavanillesi
Caña de azúcar	Cerrojo	Sonchus oleraceus
	Capiqui	Stelaria media

Dosis: Trigo y cebada : 1 a 1,5 L/há

Maíz y sorgo : 0,75 L/há malezas de 2 a 6 hojas y/o 1 L/há en aplicación total.

Caña de azúcar: 2 a 5 L en pre-emergencia del cultivo o 2 a 3 L/há en post-emergencia

Arroz : 1 a 2 L/há

Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera: Tiempo de espera: 10 días

No pastorear animales en áreas tratadas hasta 3 semanas después del tratamiento.

Compatibilidades: DAMINÉ 60 Cib es compatible con otros herbicidas como DOMBELL y RANGO 480. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Coloque agua en el tanque hasta la mitad, agregue la dosis necesaria de DAMINÉ 60 Cib, agite, complete el volumen de agua, manteniendo los agitadores en funcionamiento. **Método de aplicación:** DAMINÉ 60 Cib se aplica con pulverizadores terrestres o avión. Se puede mejorar la acción del herbicida con el agregado de un surfactante. Utilizar boquillas de abanico plano, calibre la máquina aplicadora usando como mínimo 200 L de agua /há terrestre, y/o no menos de 30 L/há en pulverización aérea. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas, de las máquinas de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales. **Tiempo de reingreso mínimo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

