

INSECTICIDA

PHARAON 35 FS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

TIAMETOXAN.....29,4 %.....350 g/l

5 lts

PHRETSLUYVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Precauciones, indicación de veneno y antidoto: Clase III (tres) IPCS/OMS 2004

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO

Grupo Químico: Neonicotinoide

ANTÍDOTO: NO TIENE ANTÍDOTO.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.

En caso de contacto con la piel: lavado de las partes afectadas. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En todos los casos consultar al médico.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros. Instrucciones de almacenamiento y manejo de envases:

Evitar ingerir o inhalar el producto o la salpicadura en ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Luego de la misma, quitarse la ropa de trabajo y lavarse prolijamente todas las partes del cuerpo expuestas. Lavar el equipo de aplicación y todos los elementos que hayan tomado contacto con el producto.

LEA LA ETIQUETA.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación: Use equipo protector con guantes, botas, mameluco y gafas mientras aplica o prepara el producto.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves, peces y abejas:

Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para abejas: Altamente tóxico pero debido al modo de uso no presenta riesgo para las abejas.



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.

12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001

E-mail: cibeles@cibeles.com.uy

Montevideo • Uruguay

USO AGRICOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PRODUCTO INFLAMABLE

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P.

Registro N° 3480

Contenido
Neto **5L**

Formulado en Uruguay por:

Cia. Cibeles S.A.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26

Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



PHARAON 35FS

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO DEBE USARSE PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL NI PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN.

EL LAVADO NO ELIMINA EL TÓXICO DE LA SEMILLA TRATADA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO SI EXISTE) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Recomendaciones de uso:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

PHARAON 35 FS es un insecticida curasemillas del grupo neoticotinoide que actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos, al provocar trastornos en las proteínas receptoras de la acetilcolina en la membrana. Tiene acción de contacto, ingestión y sistémica. Rápidamente tomado por la planta y transportado en forma acropétala por el xilema.

Instrucciones de uso			
Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (aplicación a la semilla)
Trigo	Nombre común	Nombre científico	100 ml/100 kg semilla
	Gusano alambre Isoca	Conoderus sp. Diloboderus abderus	

Momento de aplicación:

Aplicar a la semilla previo a la siembra o hasta a un mes antes.

Modo de preparación y técnicas de aplicación:

PHARAON 35 FS se aplica con máquinas curasemillas de tambor giratorio utilizando un poco de agua para la dilución del producto (máximo 1,3 lts) según el tipo de semilla, tratando que se humedezca lo menos posible. Cargar la semilla, comenzar la rotación del tambor, incorporar el curasemillas diluido en el agua a través del sistema de micropulverizadores (si lo tiene la máquina), y continuar la agitación por la rotación del tambor hasta que se note que todas las semillas han quedado homogéneamente coloreadas.

Número y frecuencia de aplicaciones:

Se realiza una aplicación en el momento indicado.

Compatibilidad:

PHARAON 35 FS no debe mezclarse con productos fuertemente ácidos o alcalinos. Tampoco se recomienda la mezcla con productos concentrados emulsionables.

Tiempo de espera:

No se establece por el tipo de aplicación a la semilla.

Tiempo de reingreso al cultivo:

No es necesario establecer por el tipo de aplicación que se recomienda.

Instrucciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original, cerrado, debidamente etiquetado, en lugar fresco, seco, alejado del sol y la luz. Revisar el vencimiento del producto. Aislar e identificar el depósito. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave.

Disposición final de envases:

Guarde el sobrante de producto en su envase original, cerrado, debidamente etiquetado, en lugar seguro y fresco. Una vez vaciados los envases, realice triple lavado de los mismos, volcando el agua del lavado en lugar seguro, igual que el agua del lavado del equipo. Evite la reutilización del envase. Perfore y destruya los mismos y almacénelos en un contenedor apropiado para su envío al Centro de Acopio más cercano.

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

