



RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Turbine 100 EC es un herbicida desarrollado para el control de avena y Ryegrass en cultivos de trigo y cebada. Actúa por inhibición de la enzima ACCasa, interfiriendo en la síntesis de diversos ácidos grasos. A los pocos días de la aplicación, las malezas detienen su crecimiento y entre 1 y 3 semanas después comienzan a mostrar síntomas de clorosis y pérdida de turgencia. No posee efecto residual. Si bien puede ser absorbido por raíces, presenta una rápida degradación en el suelo. Turbine 100 EC es selectivo para los cultivos registrados gracias a la acción del antídoto Cloquintoc Meptil.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga (1)		Dosis por hectárea	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Avena guacha	<i>Avena fatua</i>	300 cc	Previo al macollaje de la maleza
Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)	Ryegrass o pasto azul	<i>Lolium multiflorum</i>	400 cc	Posterior al macollaje de la maleza

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Aplicar en condiciones favorables al crecimiento de las malezas y una vez que el cultivo haya alcanzado por lo menos 3 hojas, y antes de la elongación del tallo. Condiciones de estrés para la maleza determinarán una pérdida de eficiencia en el control.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Una sola aplicación es suficiente.

Compatibilidad y fitotoxicidad: **TURBINE 100 EC** puede ser mezclado con otros herbicidas para ampliar su espectro de control. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Aplicado a las dosis recomendadas y en condiciones climáticas normales no presenta síntomas de fitotoxicidad. **No aplicar en trigo candeal.**

Tiempo de espera: No se establece dada la época de aplicación recomendada.

Tiempo de reintegro al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación: **TURBINE 100 EC** se diluye en agua. Agregue agua limpia en el tanque hasta la mitad, vierta la dosis indicada de **TURBINE 100 EC**, agite y complete el volumen de agua. Mantenga la agitación.

No efectuar el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.-

TURBINE 100 EC se puede aplicar en forma terrestre o aérea. En aplicaciones con máquinas terrestres utilizar un caudal de 100 a 150 L de agua/ Ha y en aplicaciones aéreas 30 L o más. Las mejores condiciones se obtienen con temperaturas no muy elevadas, buena humedad ambiente y principalmente en horas de la tarde, antes de la caída del sol.

Resol.s/n de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011:

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

Resol. N°129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)-

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Una vez finalizada la aplicación lave el tanque con agua y jabón, evitando derramar el agua de lavado sobre fuentes de agua. Utilice protección adecuada para todas estas labores.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible cerrado con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)".

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

Inflamable – Grupo de embalaje III



CUIDADO

