

HERBICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

CYNCHA EC®

® Marca registrada de Cia. Cibeles S.A.

“USO AGRICOLA”

Producto autorizado por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Registro N° 3510

NOMBRE COMÚN DEL INGREDIENTE ACTIVO: (ISO)	PORCENTAJE EN PESO:	CONTENIDO EN VOLUMEN:
Cyhalofop ester butílico	17,5 %	180 g/l
Equivalente ácido	14,8 %	152 g/l

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.



cibeles



**Formulado en Uruguay por:
Cia. Cibeles S.A.**

Planta Industrial Ruta 74 km 26
Suárez, Canelones - Uruguay

Registrante:

Cia. Cibeles S.A.

12 de diciembre 767 - Tel 2209 1001
Montevideo - Uruguay.



CUIDADO





RECOMENDACIONES DE USO: Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: **CYNCHA EC** asegura un efectivo control de gramíneas. **CYNCHA EC** detiene el crecimiento de la maleza inmediatamente después de aplicado, su modo de acción es inhibir la acetil CoA precursora de la síntesis de lípidos. La maleza tratada con el herbicida **CYNCHA EC**, muestra un cambio progresivo de coloración en las hojas, tomando éstas tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, la acción del herbicida se manifiesta por la necrosis de las yemas, estos rizomas no son viables y su descomposición dependerá de las condiciones ambientales presentes.

CYNCHA EC se puede aplicar solo sino se previenen emergencias de malezas. En aplicaciones de post emergencias tempranas se debe mezclar con CIBELCOL y en post.-tarde con EXOCET 25 FW.

INSTRUCCIONES DE USO:				
Cultivo o sitio de aplicación	Maleza		Dosis	Momento de aplicación al cultivo
	Nombre Común	Nombre Científico		
Arroz	Capin	Echinochloa cruz-galli Echinochloa crus-galli Echinochloa colonum Echinochloa helodes	1,0 a 1,5 lts/ha de CYNCHA EC + 0,8 a 1,0 lts/ha de CIBELCOL o 1,0 a 1,5 lts/ha de EXOCET 25 FW	A partir de que el arroz tenga 3-4 hojas. Inundar luego de 3-4 días de la aplicación.
Digitaria	Digitaria sanguinalis		1,0 a 1,5 lts/ha de CYNCHA EC + 0,8 a 1,0 lts/ha de CIBELCOL o 1,0 a 1,5 lts/ha de EXOCET 25 FW	A partir de que el arroz tenga 3-4 hojas. Inundar luego de 3-4 días de la aplicación.
Gramíneas perennes (Gramas)	Paspalum spp		1,0 a 1,5 lts/ha de CYNCHA EC + 0,8 a 1,0 lts/ha de CIBELCOL o 1,0 a 1,5 lts/ha de EXOCET 25 FW	A partir de que el arroz tenga 3-4 hojas. Inundar luego de 3-4 días de la aplicación.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Post emergente de la maleza, preferentemente temprano. Luego de la aplicación debe inundarse rápidamente el cultivo. Al momento de la aplicación es recomendable que la maleza se encuentre en activo crecimiento y que haya buena humedad en el suelo.

NÚMERO, FRECUENCIA DE APLICACIONES: Se realiza una aplicación en el momento indicado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia, eliminándola para que no se propague.

TIEMPO DE ESPERA: Arroz: 45 días.

TIEMPO DE REGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Colocar agua en el tanque del equipo pulverizador, agregar la dosis de **CYNCHA EC**, agitar y completar el volumen de agua. Para la mezcla con otros herbicidas recomendados, diluir éstos en un poco de agua e incorporar al tanque previo a completar el volumen de agua. Es conveniente el agregado de un aceite agrícola para mejorar las condiciones de la pulverización.

- No efectuar el llenado con agua, de las máquinas de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

CYNCHA EC se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos.

En aplicaciones terrestres utilizar picos de abanico plano a baja presión (30-50 lbs) calibrando la máquina para un volumen de 70-120 lts de agua/ha. En aplicaciones aéreas calibrar para un gasto de agua de 20-30 lts de agua/ha.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 10 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: **CYNCHA EC** es compatible con EXOCET 25F y con CIBELCOL II a las dosis recomendadas en esta etiqueta. Compatible con la mayoría de los insecticidas. No se recomienda mezclar con Propanil, 2-4 D o sulfonilureas porque generan antagonismo. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronomía o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Producto inflamable, alejarse del fuego. Mantener en su envase original, bien cerrado, debidamente etiquetado, en lugar fresco, seco, ventilado, alejado del sol y la luz. Revisar el vencimiento del producto. Asistir e identificar el depósito, señalizando con cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)". Debe estar alejado de las viviendas. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Grupo químico: aniloxifenoxipropionato.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase III LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS 2004.

ANTIDOTOS: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO PROVOCAR EL VÓMITO

- En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.

- Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con abundante agua o jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

- En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL GIAT TELEF. 1722".

"CONCUERTE EL FOLLETO EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO".

"CONCUERTE EL FOLLETO EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO".

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar ingerir o inhalar el producto o la salpicadura en ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto.

Luego de la misma, quitarse la ropa de trabajo y lavarse por completo todas las partes del cuerpo expuestas. Lavar el equipo de aplicación y todos los elementos que hayan tocado directamente con el producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Use equipo protector con guantes, botas, manguito y gafas mientras aplica o prepara el producto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: Evite contaminar aguas de ríos, arroyos o lagunas con el agua del lavado.

ECOTOXICOLÓGICA: TOXICIDAD PARA AVES: Ligeramente tóxico. **TOXICIDAD PARA PECES:** muy tóxico para peces.

TOXICIDAD PARA ABEJAS: virtualmente no tóxico. Muy tóxico para peces.

Disposición final de envases: - Guarde el sobrante de producto en su envase original, cerrado, debidamente etiquetado, en lugar seguro y fresco.

Una vez vaciados los envases, realice triple lavado de los mismos, volcando el agua del lavado en lugar seguro, igual que el agua del lavado del equipo. Evite la reutilización del envase. Perfore y destruya los mismos y almacénelos en un contenedor apropiado para su envío al Centro de Acopio mas cercano.

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".



CUIDADO

