

CURASEMILLA FUNGICIDA

Soja Speed

340 FS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
METIL TIOFANATO	20.8%	225 g/l
METALAXIL	8.1%	87.5 g/l
PIRACLOSTROBIN	2.3 %	25 g/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Metil Tiofanato: Benzimidazol; Metalaxil: Aciolanina; Piraclostrobin: Estrobilurina.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN". El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009. Antídotos: No tiene. Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.** Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe–) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Número de Registro: 4915

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Por su forma de uso no ofrece peligro, sin embargo debe considerarse que es un producto ligeramente tóxico para aves, altamente tóxico para peces y poco tóxico para abejas. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. No dejar semillas tratadas al alcance de animales domésticos o silvestres. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfome el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Fecha de Fabricación - Fecha de Vencimiento
No. Lote - Contenido Neto



Nombre del fabricante o formulador: Cia. Cibeles S.A.
12 de diciembre 767 - Tel.: 22091001
Montevideo - URUGUAY

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de diciembre 767 - Tel.: 22091001
E-mail: agro@cibeles.com.uy - Montevideo - URUGUAY
® Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: SOJASEED 340 FS es un curasemillas de acción fungicida, compuesto por tres ingredientes activos. Los tres activos son sistémicos, por lo que además de la semilla, protegen la plántula en los primeros estados de desarrollo. El modo de acción complementario de los tres ingredientes activos, amplían el espectro de acción, determinando que **SOJASEED 340 FS** sea eficaz en el control de prácticamente todas las enfermedades de importancia económica del cultivo.

Instrucciones de uso:			
Cultivo o sitio de aplicación (semillas)	Enfermedad		Dosis por hectárea
	Nombre común	Nombre Científico	
Soja	Decaimiento de semilla	<i>Phomosis sojae</i>	200 a 400 cc / 100 kg de semilla.
	Podredumbre de raíces y semilla	<i>Fusarium spp.</i>	
	Mal de almácigos	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Phytophthora sojae</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>	

Momento(s) de aplicación, número, frecuencia, o espaciamento de aplicaciones si corresponde: Se aplica a la semilla, previo a la siembra. Una sola aplicación.

Compatibilidad y fitotoxicidad: SOJASEED 340 FS normalmente se

aplica solo. Si hubiera necesidad de mezclar con otros curasemillas y se desconoce la compatibilidad o se tienen dudas sobre la mezcla realizar una prueba previa. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

Tiempo de espera: No corresponde por el momento de aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No se aplica dado el método de tratamiento indicado.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Agitar bien el envase antes de abrirlo. El tratamiento se realiza en húmedo, diluir la dosis indicada en agua limpia, hasta un máximo de 1 L de caldo y aplicar esta preparación cada 100 kg de semillas, con maquina curadora para semillas. El tratamiento debe ser uniforme y todas las semillas deben quedar cubiertas por el producto, regulando el tiempo de tratamiento hasta obtener una cobertura uniforme indicada por el color. Una vez tratada la semilla dejar secar un instante y puede sembrarse inmediatamente o almacenarse hasta 3 meses hasta la siembra.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. El agua de lavado de la máquina se debe volcar en el sitio donde se va a sembrar el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".



CUIDADO

