

FUNGICIDA

CARAVAN

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

366SE

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
PIRACLOSTROBIN	25 %	266 g/l
EPOXICONAZOL	9.4 %	100 g/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Estrobilurina + Triazol

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA". PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009. Antídotos: No tiene antídoto. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. *En caso de contacto con los ojos:* lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. *En caso de contacto con la piel,* quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. *En caso de inhalación* retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. **"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722". "CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE". "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".** Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO

–si existe–) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Número de Registro: 5077

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto poco tóxico para aves y abejas, y altamente tóxico para peces. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. **"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Fecha de Fabricación - Fecha de Vencimiento
No. Lote - Contenido Neto



cibeles

Nombre del fabricante o formulador: Cia. Cibeles S.A.
Planta Industrial Ruta 74, km 26 Suárez. Canelones – Uruguay.
País de origen: URUGUAY

Nombre y dirección de la firma registrante:
CIA CIBELES S.A.

12 de diciembre 767. - Tel.: 22091001

E-mail: agro@cibeles.com.uy - Montevideo - URUGUAY

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



CARAVAN

366SC

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

CARAVAN 366 SC es un fungicida de acción sistémica y de contacto, que actúa como preventivo, curativo y erradicante de muchas enfermedades causadas por hongos. **CARAVAN 366 SC** combina las propiedades más destacadas de dos grupos de acción, logrando: acción preventiva, curativa, antiesporulante y residualidad. **CARAVAN 366 SC** ataca al patógeno a dos niveles: bloquea su respiración e inhibe la síntesis del ergosterol. Esto mejora el control y reduce el riesgo de la generación de resistencia.

Cultivo	Enfermedad		Dosis cc/ha	Momento de aplicación:
	Nombre Común	Nombre Científico		
Trigo	Mancha amarilla	<i>Dreschlera tritici repentis</i>	500	Aplicar al inicio de floración, puede adelantarse la aplicación ante infecciones tempranas.
	Roya anaranjada	<i>Puccinia recondita</i>		
	Septoriosis	<i>Septoria tritici</i>		
Cebada	Mancha borrosa	<i>Bipolaris sorokiniana</i>	500	
Avena	Roya de la hoja	<i>Puccinia coronata</i>	500	
	Helminthosporiosis	<i>Helminthosporium avenae</i>		
Soja	Enfermedades de fin de ciclo	<i>Septoria glycines</i>	250	Puede usarse preventivo ante condiciones predisponentes para el ataque. De otros modos aplicar al observar los primeros síntomas y monitorear la evolución de la enfermedad.
		<i>Cercospora kikuchii</i>		
Maíz	Roya del maíz	<i>Puccinia maydis</i>	400	Aplicar de forma preventiva si se prevéen condiciones favorables para la enfermedad o al presenciar los primeros síntomas
Girasol	Alternaria	<i>Alternaria helianthi</i>	400 - 500	Aplicar ante la presencia de los primeros síntomas, generalmente a partir de R1.En caso de Phomopsis consultar sistemas de pronósticos regionales.
	Septoriosis	<i>Septoria helianthi</i>		
	Mancha negra del tallo	<i>Phoma oleracea</i>		

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones: Las aplicaciones se pueden repetir a los 10 o 20 días dependiendo de las condiciones ambientales predisponentes al desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por temporada.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas. Como no se conocen todos los productos a la venta, se aconseja realizar una prueba para observar el aspecto físico de la mezcla y evaluar el efecto sobre una pequeña parcela antes de realizar la aplicación, fundamentalmente coadyuvantes. No mezclar con productos de reacción alcalina.

Tiempo de espera: Trigo, Cebada y Avena: 35 días; Soja: 15 días; Maíz: 30 días; Girasol: 69 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Llene el tanque de aplicación con agua limpia. Luego agregue la cantidad recomendada de **CARAVAN 366 SC** y agite el contenido para lograr una mezcla homogénea. Mantener la agitación durante la aplicación. **CARAVAN 366 SC** puede utilizarse en aplicaciones terrestres o aéreas, y se recomienda no utilizar un volumen de agua menor a 200 L/ha y 40 L/ha respectivamente. No debe de aplicarse en días con mucho viento, temperaturas muy altas o humedad relativa muy baja.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".



CUIDADO

