

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Precauciones, indicación de veneno y antídoto:

Escala de toxicidad: Clase III (tres) IPCS/OMS, 2004 PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO.

Grupo Químico: Neonicotinoide

ANTÍDOTO: NO TIENE ANTÍDOTO.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.

En caso de contacto con la piel: lavado de las partes afectadas. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos: lave los ojos con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros.

Instrucciones de almacenamiento y manejo de envases. Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Si el tipo de envase es plástico, metal o vidrio, una vez vaciado el contenido del mismo haga el "Triple lavado" volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible, con llave. Revisar el vencimiento del producto. Aislar e identificar el depósito. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.

NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS.

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

INSECTICIDA

ESCORIAL^{25FW}

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

TIAMETOXAN.....22,1 %.....250 g/L

1 L

USO AGRICOLA - LEA LA ETIQUETA

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P. Registro N° 3479

Contenido
Neto **1 L**



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 - Tel.: 2209 1001
E-mail: cibeles@cibeles.com.uy
Montevideo • Uruguay

Formulado en Uruguay por:
Cia. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones
* Marca registrada de Cibeles

Advertencias sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves, peces y abejas:

Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.

Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico.

TOXICIDAD PARA ABEJAS: Altamente tóxico. No aplicar directamente sobre las abejas ni sobre las colmenas. Tampoco aplicar sobre praderas, sobre pasturas ni sobre cultivos en floración. En el caso de aplicar el producto, asegurarse de mantener las colmenas desde antes de la aplicación a una distancia mínima de 4 km. por el tiempo suficiente (mínimo 30 días) a los efectos de que las abejas no tengan contacto con el fitosanitario aplicado ni con sus residuos tóxicos.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO SI EXISTE) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Recomendaciones de uso.

Generalidades. Modo de acción sobre la plaga o el cultivo: **ESCORIAL 25 FW** es un insecticida del grupo neonicotinoide que actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos, al provocar trastornos en las proteínas receptoras de la acetilcolina en la membrana. Tiene acción de contacto, ingestión y sistémica. Rápidamente tomado por la planta y transportado en forma acropétala por el xilema.

Instrucciones de uso

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (aplicación foliar)
	Nombre común	Nombre científico	
Soja	Chinche verde pequeña	Piezodorus guildinii	100 mL/há + 100 mL de Alfatak 10FW

Momento de aplicación: Aplicar preferentemente cuando se note la presencia de los primeros insectos plaga.

Modo de preparación y técnicas de aplicación: **ESCORIAL 25 FW** se aplica con máquinas pulverizadoras, manuales, de tiro, o avión, utilizando un caudal de agua y un tamaño de gota suficiente como para lograr una buena cobertura de todo el follaje (terrestre: boquillas como hueco, 50-80 lb/pulgada, caudal: 300 L agua/há como mínimo). Aplicar diluido en agua. Agregar la cantidad calculada al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento, y completar el tanque con agua. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

Número y frecuencia de aplicaciones: Se realiza una aplicación en el momento indicado y si fuere necesario se debe repetir el tratamiento a los 15-20 días.

Compatibilidad: **ESCORIAL 25 FW** no debe mezclarse con productos fuertemente ácidos o alcalinos. Como coadyuvante puede utilizarse **SPRAYMIX 45 SP** a la dosis indicada en etiqueta.

Tiempo de espera: 35 días.

Tiempo de reintegro al cultivo: Se establece un tiempo de reintegro mínimo al cultivo de 24 horas luego del tratamiento.



CUIDADO

