

Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009. **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión, NO provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. Contacto con los ojos. Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NÚMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.** Otras advertencias: **Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:** A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos. B) Peligrosidad del Formulado/Ingrediente Activo: **TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MUY ALTA PELIGROSIDAD TÓXICO.** Medidas de mitigación: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos. **Realizada la evaluación de riesgo a la dosis recomendada, el riesgo es aceptable. TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TÓXICO.** Medidas de mitigación: Evitar la deriva del producto al suelo. C) Destino Ambiental: Solubilidad en agua: baja. Potencial de lixiviación: alta. Movilidad en suelo: ligeramente móvil. Estable a Hidólisis, rápida degradación por fotólisis y procesos oxidativos. Bioacumula por hirofilicidad y lipofilicidad. Persistencia en suelo: moderada. Persistencia en agua: baja. D) Potencial de volatilización: bajo. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfóre el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. En el caso de ENVASES FLEXIBLES (bolsas, vejigas) no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy. **Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado- Sustancia Tóxica" (Pictograma de calavera).

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉF: 1722".
"CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA"

XTRET1LVO

Nota: El fabricante garantiza el contenido de activo declarado, dentro del plazo de validez del producto. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de su control no se responsabiliza por daños o fallas que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia de uso o almacenamiento del producto.



Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
Azoxistrobin	22,9 %	250 g/L

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Estrobilurina		
Grupo FRAC	11	FUNGICIDA

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

Tiempo de validez del producto: 2 años

Lote:



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001
E-mail: agro@cibeles.com.uy
Montevideo • Uruguay

Fungicida
Suspensión concentrada (SC)

USO AGRÍCOLA- PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
(Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Producto autorizado por el M.G.A.P.
Número de Registro: 3975

Contenido
Neto **1 L**

Formulado en Uruguay por:
Cia. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez • Canelones

* Marca registrada de Cibeles

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: **XISTROVIN 25 SC** es un fungicida de acción sistémica y de contacto, que actúa fundamentalmente de forma preventiva, actuando inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo **XISTROVIN 25 SC** es absorbido por la planta y trasladado hacia los puntos de crecimiento controlando notablemente a aquellos hongos que desarrollan alguna parte de su ciclo en la profundidad de los tejidos. **XISTROVIN 25 SC** tiene gran efecto residual e inhibe la esporulación de varios hongos fitopatógenos.
Instrucciones de uso: Circular PROFIT

Cultivo o sitio de aplicación	Plagas/Enfermedades/Malezas controladas		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	
Papa (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Damping off Tizón temprano	<i>Rhizoctonia solani</i> <i>Alternaria solani</i>	500 - 1000 cc/ha 300 - 400 cc/ha
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	30 - 40 cc/100 L
Ajo (<i>Allium sativum</i> L.)	Roya del ajo	<i>Puccinia allii</i>	400 cc/ha
Limón (<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck) Naranja (<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck) Mandarina (<i>Citrus reticulata</i> Blanco)	Sarna de los cítricos	<i>Sphuleloma fawcetti</i>	30 cc/100 L
Arándanos (<i>Vaccinium corymbosum</i> L.)	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	500 a 750 cc/ha
Nuez de Pecán (<i>Carya illinoensis</i>)	Cladosporium	<i>Cladosporium caryeum</i>	400- 750 cc/ha
Camelina (<i>Camelina sativa</i> (L.) Czert)	Alternaria Podredumbre blanda de las hortalizas	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1000 cc/ha

Momento(s) de aplicación: No realizar más de 2 o 3 aplicaciones por temporada. **Papa:** para Damping off Tizón temprano aplicar al surco, en pulverización, al momento de la siembra, mientras que para el control de tizón temprano aplicar de forma preventiva o apenas se aprecie la enfermedad. **Tomate:** Aplicar de forma preventiva o apenas se aprecien los síntomas de Tizón temprano. **Ajo:** Aplicar de forma preventiva. **Arándanos:** Aplicar de forma preventiva o apenas se aprecien los síntomas de la enfermedad la enfermedad Alternaria alternata. **Nuez de Pecán:** Aplicar desde octubre a abril. **Camelina:** aplicar en inicio de floración en presencia de la enfermedad. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** XISTROVIN 25 SC debe ser aplicado con agua. Agitar bien el envase, cargar el tanque de la pulverizadora con agua hasta el 75% de su capacidad. Con el equipo agitador en marcha agregar la cantidad requerida de XISTROVIN 25 SC y mezclar bien. Si se han de aplicar otros fitosanitarios, prepararlos y mezclarlos bien antes de agregar el XISTROVIN 25 SC. Mantener el equipo agitador en continuo movimiento durante la preparación y hasta finalizar la aplicación. XISTROVIN 25 SC se aplica con los equipos de uso frecuente, pulverizadores o atomizadores, manuales o de tractor, siempre con agitadores, de alto o bajo volumen, siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. Las dosis por 100 L especificadas para aplicación directa al cultivo se refieren a dos productos para aplicaciones en alto volumen. Tamaño de gota máximo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto y/o dependiendo del producto aplicado. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie. **Notas:** Preparar únicamente lo estimado para el día. **Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios.** Resol. s/n de 14/5/2004 y Nº 188 DE 25/3/2011. **No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. Resol. Nº129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañados) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y talameros). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Compatibilidad y fitotoxicidad:** Se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas. Se aconseja realizar una prueba para observar el aspecto físico de la mezcla y evaluar el efecto sobre una pequeña parcela antes de realizar la aplicación, fundamentalmente coadyuvantes. Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverización se debe hacer una prueba a escala en una parcela limpia. Hecho la mezcla a escala, se aplica y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si al tiempo de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. **Tiempos de espera:** Pecan: 45 días; Papa: 14 días; Cítricos: 7 días; Ajo: 2 días y Arándano: 1. **Camelina:** 35 días En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. **Tiempo de reintegro al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir 24 horas. **Otras informaciones necesarias respecto al uso:** **PRINCIPIO DE RESISTENCIA:** Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.

CUIDADO

