Precauciones, indicación de veneno y antídoto:
No tiene antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático.

Medidas a tomar como primeros auxilios:
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.

Precauciones de empleo y destrucción de envase:
Evite el contacto del producto con los ojos o la piel. No coma, ni beba ni fume mientras manipula el producto. Utilice equipos de protección (ropa adecuada, guantes, máscara) mientras aplica o manipula el producto. Luego de finalizado el trabajo lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo que puedan haber estado en contacto con el producto. No contamine cursos de agua con el lavado del equipo o restos del producto. Realizar triple lavado del envase vacío reutilizando el agua del lavado, volcándolo en el tanque de la pulverizadora. Perfore y queme los envases vacíos y lavados y luego entierre las cenizas en lugar seguro.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES. NO ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL. 1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

suspensión concentrada

TIABENDAZOL
500 cibeles

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en vol.
Tiabendazol	**43,1 % p/p**	**500 gr/lt**

USO AGRICOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Escala de Toxicidad: Categoría IV (cuatro)

Producto autorizado por el M.G.A.P. - Registro Nº 2622

Contenido Neto 1 lt.

Registrante: **Cia.Cibeles SA**

cibeles

12 de Diciembre 767 • Montevideo URUGUAY • Tel.: 209 1001

Formulado en URUGUAY por:
Cia. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

® Marca registrada de Cibeles

Generalidades:
TIABENDAZOL 500 CIBELES es un fungicida sistémico del grupo bencimidazoles de amplio espectro.

Instrucciones para su uso:

Post Cosecha	Enfermedades N. Común	N. Científico	Dosis
Citrus	Moho azul Moho verde	Penicillium italicum Penicillium digitatum	200-400 cc en 100 lts. de agua
Boniato	Peste negra	Plenodomus destruens	700 cc/100 lt
Manzana	Podredumbre	Botrytis cinerea	150 / 100lt
Papa	Sarna negra Punta seca	Rhizoctonia solani Fusarium spp	80 cc/ton papa

Modo de aplicación:
TIABENDAZOL 500 CIBELES se diluye en un poco de agua se mezcla bien y se agrega la preparación al tanque de agua o a la pileta donde se hace baño postcosecha.

Método de aplicación:
En aplicaciones postcosecha se prepara un baño de inmersión. En boniato bañar los boniatos semillas antes del almácigo. Los plantines de boniato también se pueden sumergir en la solución antes del trasplante.

Epocas de aplicación:
Postcosecha: enseguida de la cosecha.

Compatibilidades:
TIABENDAZOL 500 CIBELES es compatible con productos normalmente usados, salvo con los de reacción alcalina. Para mayor seguridad se aconseja realizar una prueba previa.

ENVASES LACTOS TRIPLE LAVADO