

XISTROvin 25[®]

Suspensión concentrada

Fungicida

Azoxistrobin.....22,9 % p/p.....250 g/L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: Estrobirulina

Clasificación toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPSC/OMC, 2009.

Antídotos: No tiene.

Primeros auxilios: En caso de ingestión No provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la

manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.

No transportar ni almacenar con alimentos.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Poco tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces y ligeramente tóxico para abejas. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado.

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P. Registro N° 3975

Contenido
Neto **5L**



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.

12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001
Montevideo • Uruguay

Formulado en Uruguay por:

Cia. Cibeles S.A.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

® Marca registrada de Cibeles

XTRETF5LUYYO



CUIDADO



Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: XISTROVIN 25 SC es un fungicida de acción sistémica y de contacto, que actúa fundamentalmente de forma preventiva. **XISTROVIN 25 SC** es absorbido por la planta y trasladado hacia los puntos de crecimiento controlando notablemente a aquellos hongos que desarrollan alguna parte de su ciclo en la profundidad de los tejidos. **XISTROVIN 25 SC** tiene gran efecto residual e inhibe la esporulación de varios hongos fitopatógenos.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
	Nombre Común	Nombre Científico		
Papa	Sarna negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	500 -1000 cc /Ha	Aplicar al surco, en pulverización, al momento de la siembra (*).
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	300-400 cc /Ha	Aplicar de forma preventiva o apenas se aprecie la enfermedad.
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	30 -40 cc/100 L	Aplicar de forma preventiva o apenas se aprecie la enfermedad.
Ajo	Roya	<i>Puccinia allii</i>	400 cc/Ha	Aplicar de forma preventiva. Agregar CADDY LE 75 a 300 cc / Ha.
Cítrus	Sarna de los cítrus	<i>Sphaceloma fawcetti</i>	30 cc/100 L	Las aplicaciones se deben realizar entre botón floral y cuajado. No realizar más de 3 aplicaciones por temporada.
Arándanos	Alternariosis	<i>Alternaria alternata</i>	500 a 750 cc /Ha	Aplicar de forma preventiva o apenas se aprecie la enfermedad.

(*) Como complemento de otras medidas de manejo.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones: ver cuadro. No realizar más de 2 o 3 aplicaciones por temporada.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas. Como no se conocen todos los productos a la venta, se aconseja realizar una prueba para observar el aspecto físico de la mezcla y evaluar el efecto sobre una pequeña parcela antes de realizar la aplicación, fundamentalmente coadyuvantes.

Tiempo de espera: Papa: 14; cítrus: 7; ajo: 2 días; arándanos: 1 y tomate: 3 días.

Tiempo de ingreso al cultivo: no entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Coloque agua en el tanque de aplicación hasta la mitad aproximadamente. Luego agregue la cantidad recomendada de **XISTROVIN 25 SC** agite y complete la cantidad de agua. Mantenga la agitación durante la aplicación. No debe de aplicarse en días con mucho viento, temperaturas muy altas o humedad relativa muy baja. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

XTRT65LUVVO

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

