

FUNGICIDA

Cibranil®

SUSPENSION CONCENTRADA

500 FW

Clorotalonil 40.3 % p/p 500 g/L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: Cloronitrilo

Clas. toxicológica: POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL IPCS/OMS, 2009

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722

Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados al del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto ligeramente tóxico peces y abejas; poco tóxico para aves. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego performe el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P.

Registro N° 2578



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.

12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001

E-mail: cibeles@cibeles.com.uy

Montevideo • Uruguay

Formulado en Uruguay por:

Cia. Cibeles S.A.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26

Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

CIBRANIL 500 FW es un fungicida preventivo con acción de contacto para el control de un amplio espectro de enfermedades que atacan cultivos hortícolas y frutícolas. **CIBRANIL 500 FW** tiene gran adherencia, resistencia al lavado y capacidad de redistribución en el follaje hacia los crecimientos nuevos que le otorgan propiedades destacadas entre los fungicidas preventivos.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS	Momento y frecuencia de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científica		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	2,5 - 3 L/ha	Aplicar preventivamente cada 7-10 días, desde que las plantas tengan 15 cm. de alto.
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>		
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	300-350 cc/100 L	Aplicar preventivamente cada 7-10 días desde que aparece la enfermedad.
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>		
	Mancha gris	<i>Stemphylium solani</i>		
Pimiento	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	300-350 cc/100 L	Aplicar preventivamente cada 7-10 días desde que aparece la enfermedad.
Melón, Sandía, Zapallo, Pepino	Antracnosis	<i>Glomerella lagenarium</i>	350-400 cc/100 L	Aplicar preventivamente cada 7-10 días desde que aparece la enfermedad
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	350 cc/100 L	Época.- Aplicar preventivamente cada 7-10 días desde que aparece la enfermedad.
	Mancha blanca	<i>Botrytis sp</i>		
Duraznero	Torque	<i>Taphrina deformans</i>	250-350 cc/100 L	Aplicar de yema hinchada a cuajado cada 7 a 10 días.
	Viruela de la púa	<i>Phomopsis amygdali</i> (<i>Fusicoccum amygdali</i>)	350-450 cc/100 L	
Manzano	Sarna	<i>Venturia inaequalis</i>	200-250 cc/100 L	Como preventivo de acuerdo a la alarma.
Vid	Mildiu o peronospora	<i>Plasmopara viticola</i>	250-350 cc/100 L	Desde que los brotes tienen 10 cm. cada 7-10 días.
	Antracnosis	<i>Elsinoe ampelina</i>		
Citrus	Sarna de los citrus	<i>Sphaceloma fawcetti</i>	200 cc/100 L	Aplicar al inicio de la caída de pétalos, si las condiciones son propicias para la enfermedad repetir cada 14 días hasta 3 veces.
	Melanosis	<i>Diaporthe citri</i>		
Arándanos	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 cc/100 L	Desde prebrotación repletando en forma periódica, en especial hasta caída de hojas.
	Antracnosis	<i>Colletotrichum acutatum</i>		
Cebada	Ramularia	<i>Ramularia collo-cygni</i>	2 L/ha	Aplicar cuando se ven los primeros síntomas y se prevén condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad.

Compatibilidad y fitotoxicidad: **CIBRANIL 500 FW** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas frecuentemente usados. No mezclar con aceite y/o productos de reacción alcalina. No es fitotóxico bajo las condiciones de uso recomendadas. En manzano bajo ciertas condiciones climáticas puede producir roñado de frutos. **Tiempo de espera:** Melón, sandía, zapallo, pepino: 1 día; Papa: 0 día; Cebolla y Citrus: 7 días; Tomate, morrón: 5 días; Durazno y vid: 15 días; Arándanos: 12 días; Cebada: 30 días. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Agite bien el envase antes de abrirlo, coloque un poco de agua al tanque de la pulverizadora, agregue la dosis necesaria de **CIBRANIL 500 FW**, agite y complete el volumen de agua. **CIBRANIL 500 FW** se puede aplicar con máquinas de alto o bajo volumen. En caso de utilizar bajo volumen tenga en cuenta que las dosis recomendadas para 100 L de agua están basadas en un gasto promedio de 1000 L/há por lo cual deberá corregir la dosis en función del gasto de la máquina. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Nota: Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

