Herbicida

FINAL 200 SL

Concentrado Soluble

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Glufosinato de amonio	18,6%	200 g/L

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Ácido fosfínico

USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Número de Registro: 4736

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica: Clase II (dos) MODERADAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS 2009). **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** *En caso de ingestión* NO provocar el vómito. *En caso de contacto con la piel*. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. *En caso de contacto ocular*, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. *En caso de inhalación* retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto. **"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722". Y CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE". Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** No comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Evitar ingerir, inhalar, contacto con la piel o proyecciones a los ojos. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. No destapar picos con la boca. Lavarse todas las partes del cuerpo que hubieren sido expuestas a la pulverización con abundante agua y jabón. **"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Use equipo protector con guantes, botas, mameluco y gafas mientras aplica o prepara el producto. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas**: Evite contaminar aguas de ríos, arroyos o lagunas con el agua del lavado. **"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".** ***Toxicidad para aves:*** PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. ***Toxicidad para peces:*** LIGERAMENTE TOXICO. ***Toxicidad para abejas:*** VIRTUALMENTE NO TOXICO. **"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."** No contaminar lagos ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. **Disposición final de envases.**- Guarde el sobrante de producto en su envase original, cerrado, debidamente etiquetado, en lugar seguro y fresco. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

Fecha de Fabricación - Fecha de Vencimiento

No. Lote - Contenido Neto

cibeles

Nombre del fabricante o formulador: Cía. Cibeles S.A.
12 de diciembre 767 - Tel.: 22091001
Montevideo - URUGUAY

Nombre y dirección de la firma registrante: Cía. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suarez / Canelones

® Marca registrada de Cibeles

NOCIVO

ENVASES LAVADOS TRIPLE LAVADO

FINAL 200 SL

Instrucciones para su uso: FINAL 200 SL es un herbicida total de contacto, no selectivo, a utilizarse en postemergencia de la maleza recomendado para el control de amplio espectro de malezas (gramíneas, y de hoja ancha) en árboles frutales, viñedos y papa entre otros. También se recomienda para áreas no cultivadas y en aquellos cultivos tolerantes a glufosinato de amonio.

Cultivo	Malezas que controla		Dosis (lts/há)	MOMENTO DE APLICACIÓN
	Nombre común	Nombre científico		
Montes frutales, citrus	Balango Sorgo de Alepo	Avena fatua. Sorghum halepense	1,5 - 3	Aplicar a malezas en activo crecimiento. Evitar mojar troncos de cultivos que aún estén verdes
Vid	Raigras Manzanilla	Lolium multiflorum Anthemis sp.	1,5 - 2	
Cultivos tolerantes	Pasto blanco Capin Verdolaga Enredadera	Digitaria sp. Echinocloa sp. Portulaca oleracea Poligonum convolvulus	1,5 - 2	Aplicar a malezas en activo crecimiento.El cultivo resistente debe estar en estado de 3-4 hojas
Zonas no cultivadas	Yuyo colorado Gramilla	Amaranthus sp. Cynodon dactylon	2-3,5	Aplicar a malezas en activo crecimiento
Papa	Crucíferas (rábano,nabo silvestre y mostacilla) Lengua de vaca Corriguela	Raphanus rapanistrum, Brassica campestris, Rapistrum rugosum, Rumex sp. Convolvulus sp.	2-3	Aplicar cuando el cultivo haya terminado su desarrollo vegetativo No aplicar sobre el cultivo destinado a semilla.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

Momento de aplicación: (1)-La dosis mínima se aplica cuando las condiciones son favorables y las malezas están pequeñas. La dosis mayor se utiliza cuando las malezas están mas desarrolladas, las condiciones de control son desfavorables o cuando exista mayor densidad de malezas.

(2) -En malezas gramíneas se recomienda aplicar entre el estado de 3 hojas hasta el macollaje y para malezas de hoja ancha aplicar al comienzo del estado vegetativo.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Normalmente se realiza una sola aplicación en el momento indicado.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios utilizados normalmente, pero en caso de duda o desconocimiento de su comportamiento con otro producto realizar una prueba de compatibilidad anterior a la aplicación en el cultivo. En cuanto a la fitotoxicidad tener la precaución de no aplicar o mojar tejidos verdes o en crecimiento de los cultivos no tolerantes.

Tiempo de espera: No corresponde dado la característica del producto (rápidamente degradable y de acción no sistémica) y su momento de aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y tecnica de aplicación: FINAL 200 SL se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Agitar bien el envase, llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador en marcha verter la cantidad necesaria de **FINAL 200 SL**, agitar, completar el volumen de agua y mantener la agitación. No efectuar el llenado con agua, de las máquinas de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Instrucciones de almacenamiento: Mantener en su envase original, bien cerrado, debidamente etiquetado, en lugar fresco, seco, ventilado, alejado del sol y la luz. Revisar el vencimiento del producto. Aislar e identificar el depósito, señalizando con cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calavera)" Debe estar alejado de las viviendas. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave.

NOCIVO