



**Insecticida  
Suspensión concentrada**

**CIB® 60 FS**

**Curasemillas**

® MARCA REGISTRADA DE CIA. CIBELES

Principio Activo  
**Imidacloprid**

% en peso  
48% p/p

Concentración en volumen  
600 g/L

**Precauciones, indicación de veneno y antídotos:** No tiene antídoto.  
**Grupo químico:** neonicotinoide. **Clasificación toxicológica:** Clase II (dos) IPCS/OMS, 2004. **Moderadamente peligroso.**

**Medidas a tomar como primeros auxilios:** En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de contacto ocular lavar los ojos con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. **En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta y/o envase del producto.** En caso de intoxicación llamar al CIAT - Teléfono (02)1722.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, instrucciones de almacenamiento y manejo de envases:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón, todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada

aplicación. **No contaminar lagos, ríos u otras fuentes de agua o corrientes de agua con restos del producto.** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal. Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)". "Manténgase fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas o irresponsables". "No transportar ni almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas."

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Toxicidad para aves: Ligeramente-moderadamente tóxico. / Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para abejas: Altamente tóxico, pero debido a su modo de uso no representa peligro. **No debe usarse para tratar granos destinados a la alimentación humana o animal ni para la industrialización. El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada.**

**USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P.

Registro N° 3006

Contenido  
Neto **5 L**



**cibeles**

Registrante: Cia. Cibeles S.A.  
12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001  
Montevideo • Uruguay



Formulado en Uruguay por:  
Cia. Cibeles S.A.  
Planta Industrial: Ruta 74, km 26  
Joaquín Suárez / Canelones

\* Marca registrada de Cibeles



**NOCIVO**



### Generalidades e instrucciones para su uso:

GAVILAN Cib 60 FS es un insecticida curasemillas que actúa en forma sistémica, por contacto e ingestión. Es absorbido por las raíces de la plántula en crecimiento y posteriormente trasladado a todo el vegetal. Controla insectos de suelo. Presenta acción repelente para hormigas cuando es usado en la dosis recomendada.

### Modo y método de aplicación:

En máquinas curasemillas, colocar la semilla y agregar la dosis de GAVILAN Cib 60FS diluida en aproximadamente 1 litro de agua. Revolver hasta que quede uniformemente coloreada.

### Epocas de aplicación:

Previo a la siembra

### Dosis:

Las dosis están indicadas para 100 kg de semilla. Para utilizar el efecto repelente contra hormigas en girasol y maíz se debe aplicar la dosis recomendada. El efecto contra pulgones permite un control de hasta 60 días luego de la siembra

### Compatibilidades

GAVILAN Cib 60FS es compatible con otros curasemillas formulados por Cibeles.

Cultivo	Plaga		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
(semilla)			cada 100 Kg de semilla
Girasol	Insectos de suelo	Cyclocephala sp	200-300cc
	Gusano alambre	Conoderus spp	200-300cc
Maíz	Gorgojo del suelo	Pantomorus sp.	200-300cc
	Isocas	Diloboderus spp	200-300cc
Sorgo	Hormigas cortadoras	Acromyrmex spp	500-600cc

Nota: Cibeles garantiza el contenido de activo declarado dentro del plazo de validez del producto. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de su control, no se responsabiliza por daños o fallos eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso o almacenamiento del producto.

