"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES".

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".**

Disposición final de envases.- Vaciar completamente el contenido del envase. Haga el "triple lavado" del mismo, volcando el liquido resultante en el tanque del equipo aplicador. Luego perfore el envase vacío para evitar su reutilización y enviarlo a los Centros de Acopio.

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2009

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: **NO** provocar el vómito. *Contacto con la piel:* Quitar las ropas contaminadas. Lavar la piel con abundante agua y jabón. *Contacto con los ojos:* Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. *En caso de inhalación:* retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando esta etiqueta y el envase o folleto acompañante.
"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".
"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.
Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO. Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TOXICO. Toxicidad para abejas: MODERADAMENTE TOXICO
"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."
Toxicidad para abejas: PRODUCTO PELIGROSO.Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

INSECTICIDA

RYNAGEN 200 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Clorantraniliprole	18.3 %	200 g/L

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:
Diamidas antranílicas
Producto autorizado por el MGAP Registro N° 4560

"USO AGRICOLA"
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Contenido Neto **1 L**

cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 - Tel.: 2209 1001
E-mail: agro@cibeles.com.uy
Montevideo - Uruguay

Formulado en Uruguay por:
Cía. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones
® Marca registrada de Cibeles

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: RYNAGEN 200 SC es un agonista los receptores de rianodina en los músculos de los insectos. Al activar estos receptores se produce una liberación excesiva del calcio desde dentro de las células musculares, lo que impide al insecto regular las contracciones musculares. Al poco tiempo el insecto se paraliza, interrumpe su alimentación y muere. **RYNAGEN 200 SC** puede incorporarse al esquema de manejo de plagas con insecticidas neurotóxicos, ya que presenta distinto modo de acción. Es un producto sistémico en la planta que actúa por ingestión en el insecto. Presenta prolongada residualidad. Su principal uso es sobre lepidópteros, y presenta poco efecto sobre insectos benéficos y otros organismos del ecosistema. Grupo IRAC: 28.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga (1)		Dosis	Momento de aplicación:
	Nombre Común	Nombre Científico		
Soja	Lagarta de las leguminosas	*Anticarsia gemmatalis*	30 cc/ha	Monitorear los cultivos y aplicar cuando se superen los umbrales de intervención química.
	Lagarta del girasol	*Rachiplusia nu*		
	Plusia	*Chrysodeixis indludens*		

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: No realizar más de dos aplicaciones consecutivas de **RYNAGEN 200 SC**, alternar con otro insecticida con diferente modo de acción.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: 21 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas..

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso
Modo de preparación y técnica de aplicación: Para preparar el caldo de aplicación, colocar un poco de agua en el tanque de la máquina, agregar el Grun OL, y luego la dosis necesaria de **RYNAGEN 200 SC**. Agitar y completar el volumen de agua. El pH del agua utilizada no debe estar por encima de 7. **RYNAGEN 200 SC** puede ser utilizado tanto en aplicaciones terrestres como aéreas. En caso de aplicaciones terrestres el volumen de agua a utilizar debe de ser de al menos 100 lt/há y en áreas 30 lts/há.
Notas: Preparar únicamente lo estimado para el día
No realizar aplicaciones aéreas en ningún tipo de cultivo a una distancia menor a 500 metros de cualquier zona urbana o sub-urbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas sobre cultivos extensivos (cereales, oleaginosos, o forrajeros) a una distancia menor a 300 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.
No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia menor a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).
No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

CUIDADO