



HERBICIDA setodim ultra[®]

concentrado emulsionable

Setoxidim

25 % p/p

250 g/l

Precauciones, indicación de veneno y antidotos:

No tiene antidoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

Grupo Químico: OXIMA-CICLOHEXANODIONA

Escala de toxicidad: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2004

Medidas a tomar como primeros auxilios: en caso de ingestión NO PROVOCAR EL VÓMITO ni dar a beber ningún líquido. Llamar de inmediato al médico o trasladar al paciente a un Centro de Asistencia. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

Concurrir al médico llevando etiqueta y/o envase del producto.

En caso de intoxicación llamar al CIAI, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, instrucciones de almacenamiento y manejo de envases. Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el

producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego pefore el envase para evitar su reutilización como tal.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS. PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)".

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO

Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TOXICO

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

USO AGRICOLA - LEA LA ETIQUETA

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Producto autorizado por el M.G.A.P.

Registro N° 3146

Contenido
Neto **5 lts.**



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.

12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 1001

Montevideo • Uruguay



Formulado en Uruguay por:
Cia. Cibeles S.A.
Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



Generalidades e instrucciones para su uso:

SETODIM ULTRA es un herbicida sistémico, selectivo post-emergente para el control de malezas anuales y perennes en cultivos hortícolas, frutícolas, girasol y soja. Actúa bloqueando la respiración y el crecimiento a nivel de la yema apical. No tiene efecto residual en el suelo, por lo que debe pulverizarse después que hayan emergido todas las malezas. Es muy exigente en humedad del suelo y no debe aplicarse en suelos secos.

Cultivo	Nombre común	Nombre científico
Girasol, soja	Avena guacha	Avena fatua
Arroz	Pasto roseta	Cenchrus echinatus
Hortalizas (ajo, cebolla, acelga, espinaca, apio, arveja, poroto, col, repollo, brócoli, boniato, papa, zapallo, espárrago, lenteja, lechuga, frutilla, berenjena, tomate, pimiento, zanahoria)	Capin	Echinochloa cruz galli
Sandía, melón, Frutales de carozo,	Cola de zorro	Setaria viridis
Frutales de pepita, Arándanos, olivos, Vid, citrus	Braquiaria	Brachiaria sp
Ornamentales	Capin colona	Echinochloa colonum
Forestales, Alfalfa	Pasto blanco	Digitaria sanguinalis
	Gramilla de huerta	Eragrostis virescens
	Pata de gallina	Eleusine spp.
	Gramilla brava	Cynodon dactylon
	Sorgo de halepo	Sorghum halepense

Modo de aplicación:

SETODIM ULTRA se diluye en agua. Agregue agua limpia en el tanque hasta la mitad, vierta la dosis indicada de SETODIM ULTRA, agite y complete el volumen de agua. Mantenga la agitación.

Método de aplicación:

SETODIM ULTRA se puede aplicar en forma terrestre o aérea. En aplicaciones con máquinas terrestres utilizar un caudal de 100 a 150 lts de agua/ha y en aplicaciones aéreas 30 lts o mas. No debe aplicarse con vientos que deriven el producto a áreas vecinas. Las mejores condiciones se obtienen con temperaturas no muy elevadas, buena humedad ambiente y principalmente en horas de la tarde antes de la caída del sol. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos a una distancia inferior a 300 metros, ni aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres a menos de 10 mts. de cualquier corriente de agua o fuentes superficiales, ni aéreas a menos de 30 mts.

Nota: Ciba. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.

Epocas de aplicación y dosis

Maleza	Epoca de aplicación	dosis (lt/ha)
Anuales	3 a 6 hojas	0,6
Avena, trigo y cebadilla	2 a 4 hojas	0,7a 0,8
Gramilla brava	Estolones de 5-10 cm	2 a 3
Sorgo de alepo (de semilla)	5 a 10 cm de alto	0,75 a 1
(de rizoma)	10 a 15 cm de alto	1,75 a 2,25
Capin y gramas en arroz	4 hojas a inicio macollos	0,3 a 0,4

IMPORTANTE: es recomendable agregar un aceite fino, de buena calidad, no fitotóxico a razón de 1-2lt/ha.

SETODIM ULTRA es muy exigente en humedad, no debe aplicarse en suelo seco. Las dosis recomendadas están dadas para condiciones de suelo de buena humedad. En arroz no debe aplicarse en suelos con charcos de agua, ni en cultivos con menos de 3 hojas o en embarrigado. Luego de la aplicación debe inundarse la chacra lo antes posible (antes de 5 días).

Tiempo de reingreso mínimo:

Cuando el producto aplicado haya secado considerando como mínimo 48 horas.

Tiempo de espera

1 día: espárrago

7 días: frutilla, alcaucil

15 días: Citrus, arvejas, zapallo, sandía, melón, frutales

20 días: berenjena, tomate, pimiento

30 días: acelga, ajo, apio, cebolla, boniato, brócoli, lechuga, repollo, papa, boniato zanahoria, arándano.

50 días: lenteja, poroto

60 días: remolacha, vid

70 días: girasol, soja

Compatibilidades:

SETODIM ULTRA puede ser mezclado con otros herbicidas para mejorar su espectro de control. No debe mezclarse con productos de reacción alcalina. Sería conveniente realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar mezclas de las cuales se tienen dudas.

