







PARA URUGUAY Y EL MUNDO



En **CIBELES** desarrollamos y formulamos productos para Uruguay y el mundo. **CIBELES** es una **empresa de capitales 100% uruguayos, con más de 50 años** en el mercado.

CIBELES ha cumplido exitosamente su misión empresarial, estableciendo un firme compromiso con la excelencia de gestión en todas sus áreas de actividad.

Uno de los principales objetivos de la compañía siempre ha sido ofrecerle a los clientes productos novedosos y con los más altos estándares de calidad, acompañados de un servicio técnico del más alto nivel.

Contamos con una **Planta Industrial y un equipo de profesionales** que nos permiten desarrollar y formular una amplia gama de productos que brindan soluciones a las distintas necesidades, tanto en el mercado uruguayo como en el resto del mundo.

CIBELES EN AMÉRICA:

Actualmente CIBELES exporta sus productos a:

- ARGENTINA
- BOLIVIA
- GUATEMALA
- HONDURAS
- MEXICO
- NICARAGUA
- PANAMÁ
- PARAGUAY
- REPÚBLICA DOMINICANA



CONFIANZA EN LA CALIDAD



Compañía **CIBELES SA** cuenta con calidad internacional certificada.

Las **GMP** (Good Manufacturing Practices - Buenas Prácticas de Fabricación) son un conjunto de normas y procedimientos que permiten monitorear la totalidad del proceso productivo farmacéutico, desde el ingreso de materias primas hasta la aprobación del producto terminado.

La mayoría de los productores de la industria farmacéutica en los países desarrollados adoptan los estándares **GMP** como medio para asegurar la calidad de sus productos. En el caso de **CIBELES** estas normas le permiten la posibilidad de reforzar la confianza por parte de sus clientes nacionales e internacionales.

Las normas **GMP** es una certificación internacional que es otorgada por el organismo correspondiente en cada país.

En Uruguay, esta tarea corresponde al **DILAVE** (División de Laboratorios Veterinarios) perteneciente al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.



Línea **GARRAPATICIDAS CIBELES**

LA GARRAPATA NO PASA

- **Pour on**
- **Baños de Inmersión**
- **Baños de Aspersión**
- **Injectables**

ZURON TOP

Inhibidor del desarrollo de garrapatas.



PRINCIPIO ACTIVO: Fluazuron 2,5%

VÍA DE APLICACIÓN: Pour-on.

DOSIS: 1 mL/10 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 5L.



TIEMPO DE ESPERA:

IDEAL PARA COMBATIR LA GARRAPATA del invierno continuando en la primavera y verano, con lo cual limitará la población de garrapata del otoño

CARNE: Terneros que tomen leche de madres tratadas:
42 días No faenar hasta 4 meses luego de la última toma.

No administrar en vacas en lactancia cuya leche se destine a consumo humano.

FIPRO TOP

Garrapaticida e Insecticida de amplio espectro.



PRINCIPIO ACTIVO: Fipronil 1%

VÍA DE APLICACIÓN: Pour-on.

DOSIS: 1 mL/10 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 5 L.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE
100 días

No usar en vacas lecheras cuya producción se destine a consumo humano ni en vaquillonas hasta 3 meses antes del parto.

ECO TOP

Garrapaticida y Endectocida.



PRINCIPIO ACTIVO: Eprinomectina 0.5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Pour-on.

DOSIS: 1 mL/10 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L.



No detenga su producción de leche o retrase su embarque, ECOTOP tiene tiempo de espera 0



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:

0 días

LECHE:

0 días

SUPERTRAZ

Garrapaticida.



PRINCIPIO ACTIVO: Amitraz 12,5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Inmersión o aspersión.

DOSIS: Aspersión: 1 L / 500 L o 2 L / 1000 L.

Inmersión: Pie de Baño 1,6 L / 1000 L + 5 Kg cal.

Reposición y Refuerzo: 3,2 L / 1000 L
+ 10 Kg cal.

Refuerzo en seco: 1,6 L + 5 Kg cal.

PRESENTACIÓN: Pack: 3,2 L
+ 10 Kg cal, Bidón 3,2 L, 1 L

GARRAPATICIDAS

PARA USO EN:
Aspersión o Inmersión.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE

14 días

LECHE

24 horas. Para uso en Aspersión e Inmersión.



SUPERMETRINA BAÑO

Garrapaticida, piojicida, sarnicida y mosquicida.



PRINCIPIO ACTIVO: Cipermetrina 10%, Ethion 40%.

VÍA DE APLICACIÓN: Inmersión o Aspersión.

DOSIS: **Aspersión:** 1 L / 1000 L. **Inmersión:** Pie de Baño 1 L / 1000 L. **Reposición y Refuerzo:** 1,5 L / 1000 L. **Refuerzo en seco:** 0,5 L / 1000 L.

PRESENTACIÓN: 1 L, 5 L.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:

130 días luego del último tratamiento.

No usar en vacas en lactancia si la leche tiene destino humano. Para uso en Aspersión e Inmersión.



ALFASUPERMETRINA

Mosquicida y piojicida.



PRINCIPIO ACTIVO: Alfacipermetrina 1.5%, Butóxido de piperonilo 6%.

VÍA DE APLICACIÓN: Pour-on.

DOSIS: 5 mL/200 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L.

MOSQUICIDAS



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
6 días

LECHE:
6 horas



DEXA CIBELES

Antiinflamatorio corticoide.



PRINCIPIO ACTIVO: Dexametasona 0,2 %.

VÍA DE APLICACIÓN: I/V, I/M,
intraarticular.

DOSIS: Equinos y bovinos: 5-15 mL.

Terneros y potros: 1-2.5 mL.

Ovinos, suinos y caprinos: 1-2.5 mL.

Caninos: 0.12-1 mL.

Intraarticular: 1-5 mL.

PRESENTACIÓN: 50 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:

6 días

LECHE:

0



DIMIDOCARBO ^{B₁₂}

Tratamiento y prevención tristeza parasitaria.



PRINCIPIO ACTIVO: Dipropionato de Imidocarbo 12%. Vitamina B12 5mg.

VÍA DE APLICACIÓN: Bovinos y Caninos: Subcutánea. Equinos: I/M.

DOSIS: Bovinos: 1 mL/100 Kg. Control de babesias. Prevención de Babesias y control de Anaplasma 2,5 mL/100 Kg.

PRESENTACIÓN: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.



 **TIEMPO DE ESPERA:**

CARNE | Bovinos
213 días

No administrar a vacas en lactancia
cuya leche tenga destino humano.



BUMERANG 3,15%

Endectocida garrapaticida.



PRINCIPIO ACTIVO: Ivermectina 3.15%
de Formulación Tixotrópica

TIEMPO DE EFICACIA: Parásitos
gastroenteropulmonares: entre 35 y 49 días.
Garrapata: 45 días para predios en plan de
erradicación.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL/50 Kg.

PRESENTACIÓN: 100 mL, 500 mL.



FORMULACIÓN TIXOTRÓPICA
que asegura la larga acción y un
excelente control de la garrapata



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
122 días

LECHE:
No usar en hembras en lactancia cuya leche tenga destino humano.



4x2

Endoparasitícida y ectoparasitícida de amplio espectro.



PRINCIPIO ACTIVO: Ivermectina 1 %.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: Bovinos y ovinos: 1 mL/50 Kg.
Suinos: 1 mL/33 Kg.

PRESENTACIÓN: 50 mL, 100 mL,
500 mL, 1 L.



 **TIEMPO DE ESPERA:**

CARNE | Bovinos:
35 días

OVINOS:
21 días

SUINOS:
28 días

LECHE:
No usar en hembras en lactancia cuya leche tenga
destino humano.



4X4 FULL

Endectocida y Fasciolicida con Hepatoprotector.

PRINCIPIO ACTIVO: Closantel 12.5%, Ivermectina 1%, Acetilmetionina 1%.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL /50 Kg.

PRESENTACIÓN: 50 mL, 100 mL, 500 mL.



 **TIEMPO DE ESPERA:**

CARNE:
42 días

LECHE:

No usar en hembras en lactancia cuya leche tenga destino humano.

4X4 NITRO

Para el tratamiento y control de Fasciola hepática adulta y parasitosis a nematodos gastrointestinales pulmonares, piojos, sarna y dermatobia.

PRINCIPIO ACTIVO: Nitroxinil 34%, Ivermectina 1%.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL/50 Kg.

PRESENTACIÓN: 50 mL, 100 mL, 500 mL.



 **TIEMPO DE ESPERA:**

CARNE:
60 días

LECHE:

No usar en hembras en lactancia cuya leche tenga destino humano.

6X6 | CONTROL DE PARASITOS INTERNOS Y RESISTENCIA



Las parasitosis internas, especialmente las gastrointestinales, son una de las principales **limitantes en la ganancia de peso** en las categorías jóvenes de los bovinos en el Uruguay.

El control de estas parasitosis se ha basado desde hace muchos años fundamentalmente en antihelmínticos inyectables.

El uso masivo de las Lactonas Macrocíclicas especialmente de la Ivermectina generó que algunos parásitos fueran tolerando y finalmente haciéndose resistentes a la misma. Ese es el caso específico del endoparásito más prevalente en el Uruguay, la Cooperia, un nematode parásito del intestino delgado. La Resistencia Antihelmíntica a las Lactonas Macrocíclicas está muy difundida, especialmente en zonas templadas del mundo.

El uso masivo de este tipo de productos en el control de Garrapata, ha acelerado aún más el proceso de **resistencia de los parásitos gastrointestinales**, por el aumento de tratamientos al año que ese parásito exige.

Dado que la Ivermectina mantiene buena eficacia sobre el resto de su espectro, logramos recuperar su eficacia original combinándola con un producto específico que controla muy bien la Cooperia. Ese producto es el **Fosfato de levamisol**.

De esta manera el **6x6 inyectable** es una combinación de Ivermectina y Levamisol que logra devolverle a la Ivermectina su eficacia original, recuperando todo su espectro sobre los parásitos más importantes en los vacunos. El producto se diseñó para dosificar a razón de 1 ml cada 25 kg lo que lo hace muy práctico para categorías jóvenes que son las más susceptibles a estos parásitos. **6x6 inyectable** es el producto ideal para **desparasitar terneros a partir del destete** y durante su primer invierno / primavera. Luego como sobreaño, a partir del otoño invierno **hasta los 2 años de vida**.



Endectocida.

PRINCIPIO ACTIVO: Ivermectina 0,5%,
Levamisol 22,3%.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL/25 Kg

PRESENTACIÓN: 250 mL, 500mL.



INDICACIONES

Para el tratamiento y control de nematodos gastro-entero pulmonares, sarna, piojos y Dermatobia en bovinos. El producto demostró controlar en forma eficaz cepas de Cooperia y Haemonchus resistentes a las Lactonas Macroclínicas.

• Endoparásitos:

• **Nematodos gastrointestinales:** Ostertagia ostertagi (incluyendo larvas inhibidas) Ostertagia lyrata (adultos), Haemonchus placei, Mecistocirrus digitatus (adultos), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia spp., Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata (adultos), Nematodirus helvetianus (adultos), N. Spathiger (adultos), Strongyloides papillosus (adultos), Toxocara vitulorum (adultos), Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum,

• **Parásitos pulmonares:** Dictyocaulus viviparus (adultos, inmaduros y larvas inhibidas).

• **Ectoparásitos:** Dermatobia homini (ura), Piojos chupadores: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus,

• **Ácaros:** Psoroptes ovis var. bovis, P. communis var. ovis



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
56 días

LECHE:
No usar en vacas lecheras en lactancia
cuya leche tenga destino humano.

6X6

COMPOSICIÓN CADA 100ML
CONTIENE:

Ivermectina	0,5g
Levamisol	22,3g

CLICK

Tratamiento y control de larga acción de gusanos redondos gastrointestinales, lombriz del pulmón, parásitos del ojo, Ura, Bicheras, piojos y ácaros de la Sarna. Garrapaticida bovino.



PRINCIPIO ACTIVO: Doramectina 1%.

VÍA DE APLICACIÓN: Bovinos y ovinos: Subcutánea o I/M. Porcinos: I/M.

DOSIS: Bovinos y Ovinos: 1mL/50Kg de peso vivo. Suinos: 1mL/33 Kg de peso vivo.

PRESENTACIÓN: 100mL, 500mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE | Bovinos
50 días

OVINOS:
35 días

SUINOS:
28 días

LECHE:

No usar en hembras lactantes cuya leche se destine al consumo humano.

DAMERO

Antiparasitario interno para bovinos. Saguaypicida.



PRINCIPIO ACTIVO: Nitroxinil 34%.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL/50 Kg.

PRESENTACIÓN: 100 mL, 500 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
60 días

LECHE:
No usar en hembras en lactancia cuya leche tenga destino humano.

FASITEL 12,5%

Eficaz contra infestaciones por nematodos gastrointestinales, trematodos y ectoparásitos de los bovinos.



PRINCIPIO ACTIVO: Closantel 12,5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea o I/M.

DOSIS: 1ml/50 kg para: **Nematodos gastrointestinales:** Haemonchus, Oesophagostomum y Bunostomum y Fasciola hepática Adulta. **1 ml/25 kg para:** **Fasciola hepática inmadura** de más de 8 semanas y **Nematodos Gastrointestinales:** Haemonchus, Oesophagostomum y Bunostomum.

PRESENTACIÓN: 500 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
42 días

LECHE:
No usar en hembras en lactancia cuya leche tenga destino humano

PANDORA

Antiparasitario interno. Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y pulmonares.



PRINCIPIO ACTIVO: Fosfato de levamisol 22,3 %.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL / 36,4 Kg.

PRESENTACIÓN: 100 mL, 250 mL, 500 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
7 días

LECHE:
96 horas

SKIPPER

Antiparasitario interno para bovinos de amplio espectro y triple acción (adultos, inmaduros y huevos) contra nematodos gastrointestinales y pulmonares.



PRINCIPIO ACTIVO: Ricobendazol 15%.

VÍA DE APLICACIÓN: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL/40 Kg.

PRESENTACIÓN: 500 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE | Bovinos
28 días

LECHE:
3 días



ZEPPELIN

Fasciolicida y saguaypicida. Formas adultas e inmaduras hasta 8 semanas.



PRINCIPIO ACTIVO: Clorsulón 10%.

TIEMPO DE EFICACIA: Subcutánea.

DOSIS: 1 mL/50 Kg.

PRESENTACIÓN: 500 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
35 días

LECHE:
7 días



ECOMILK NF 20%

Fasciolicida y contra Paramphistomum.



PRINCIPIO ACTIVO: Oxiclozanide 20%.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral e Intraruminal.

DOSIS: 1 mL/20 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 3 L.



La Oxiclozanida es una salicilanilida que actúa interfiriendo con el metabolismo del parásito. Tiene una alta eficacia contra las formas adultas del saguaypé y Paramphistomum en bovinos, que producen importantes daños en las categorías más jóvenes. También tiene efecto, dependiendo de la dosis, contra nematodos hematófagos y larvas de hipoderma y oestrus spp.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
14 días

LECHE:
0 horas



TRIMETO 3S

Antibiotico de amplio espectro.



INDICACIONES: Infecciones primarias o secundarias del tracto respiratorio, digestivo y urogenital.

PRINCIPIO ACTIVO: Trimetoprim 4%, Sulfatiazol 4%, Sulfadiazina 6%, Sulfamerazina 10%

VÍA DE APLICACIÓN: I/M.

DOSIS: Bovinos adultos: 7 mL/100 kg p.v.

Terneros: 4 mL/50 kg p.v.

Cerdos: 7 mL/100 kg p.v.

Lechones al destete: 1 mL/15 kg p.v.

Lechones: 0.5 a 1 mL por animal.

PRESENTACIÓN: 20 mL, 50mL y 100mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
28 días

LECHE:
5 días





**PROTEJA SU
MAJADA CONTRA
EL PIOJO**

SMART

Piojicida lanar de uso en seco con aplicador en lana corta hasta 7 días post esquila.



PRINCIPIO ACTIVO: Imidacloprid 3,5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Pour-on.

PRESENTACIÓN: 1 L, 5 L.

DOSIS:

PESO CORPORAL (kg)	DOSIS (ml)	MÉTODO	APLICAR SEGÚN PATRÓN
Menos de 6	8	Línea simple	
6-8	12		
8-10	15		
10-12,5	20		
12,5-15	25		
15-20	30		
20-30	40	Línea doble	
30-55	60		
55-80	80		
80-100	90		



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
62 días

LECHE:
No indicado

LANA:
60 días



LA TOMA IDEAL
PARA SUS
CORDEROS

BONLAM

Antihelmíntico, Nematodocida, Cestodocida y Oestricida.



PRINCIPIO ACTIVO: Ivermectina 0.1 % + Levamisol 4 % + Praziquantel 1.88 %.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral.

DOSIS: 1ml/5kg.

PRESENTACIÓN: 1 L., 3 L.




TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
28 días

LECHE:
No usar en ovejas en lactancia si la leche tiene destino humano.

RANIZOLE

Triple combinación de activos para un excelente control antihelmíntico y fasciolicida.



PRINCIPIO ACTIVO: Ivermectina 0.2 %, Levamisol 8 %, Rafoxanida 7.5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral.

DOSIS: 1 mL/10 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 3 L.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
42 días

LECHE:
No administrar en animales en lactancia cuya leche tenga destino humano.



RANIDE NF

Fasciolicida, Haemonchicida y Oestricida para bovinos, ovinos y caprinos.



PRINCIPIO ACTIVO: Rafoxanida 7,5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral.

DOSIS: 1 mL/10 kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 3 L.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE	Bovinos	Ovinos
	28 días	42 días

LECHE:

No utilizar en hembras lactantes si la leche tiene destino humano.



RAIDER PLUS

Antiparasitario interno y externo.



PRINCIPIO ACTIVO: Levamisol HCl 8%. Ivermectina 0,2%, Albendazol 5%.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral.

DOSIS: 1 mL/10 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 3 L.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
28 días

LECHE:
No administrar en animales en lactancia cuya leche tenga destino humano.



TRITOM NF

Antihelmíntico para ovinos desarrollado para eliminar los parásitos resistentes, con especial énfasis en el *Haemonchus contortus* (gusano del cuajo) en todos sus estadios. Seguro de usar en ovejas preñadas.



PRINCIPIO ACTIVO: Naphtalophos micronizado 15%.

VÍA DE APLICACIÓN: Oral.

DOSIS: *Haemonchus*: 1 mL/5 Kg.
Haemonchus, *Ostertagia*,
Trichostrongylus axei,
T. colubriformis y *Cooperia*: 1 mL/3 Kg.

PRESENTACIÓN: 1 L, 5 L.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
14 días

LECHE:

No usar en ovejas en lactancia si la leche tiene destino humano.



ROBOMAX^{VIT} B₁₂

Roborante. Reconstituyente. Energizante.



PRINCIPIO ACTIVO: Cloruro de fosforilcolina cálcica 5 g, Vit B12 5,5 mg, Digerido ácido de caseína 5 g, Excipientes c.s.p. 100 mL.

VÍA DE APLICACIÓN: I/V, S/C o I/M.

DOSIS: Bovino adulto: 10-25 mL. Equino adulto: 15-20 mL. Terneros y Potros: 5-15 mL. Ovejas y Cabras: 3-5 mL. Corderos y Cabritos: 2-3 mL. Porcino adulto: 5-10 mL. Lechones: 1-3 mL.

PRESENTACIÓN: 250 mL, 500 mL.



Ideal para utilizar junto a nuestros bloques nutricionales



CIBEL-FOS INY

Indicado en bovinos, ovinos y porcinos para la prevención y tratamiento de deficiencias de fósforo, selenio, magnesio, cobre y potasio y sus consecuencias.



COMPOSICIÓN: Cloruro de cobre dihidrato 0,4 g, Glicerofosfato de sodio hemiundecahidrato 14,0 g, Fosfato monosódico dihidrato 20,1 g, Cloruro de potasio 0,6 g, Cloruro de magnesio hexahidrato 2,5 g, Selenato de sodio 0,24 g, Excipientes c.s.p. 100 mL.

VÍA DE APLICACIÓN:

Inyectable I/M o S/C.

DOSIS: Bovino adulto: 10 mL. Bovino Ternero: 5 mL. Ovinos y Suinos: 5 mL por animal.

PRESENTACIÓN: 250 mL y 500 mL.



Especialmente indicado para preparar su ganado de cría antes y durante el entore junto a nuestros suplementos fosfóricos



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:
20 días

LECHE:
72 horas



INTRODUCCIÓN

Esta guía pretende ser un apoyo para la toma de decisiones a nivel de establecimiento ganadero. En la misma encontrarán los diferentes usos de los suplementos, las categorías objetivo, el tipo de pastura a ser suplementada y si el objetivo de la suplementación es mantenimiento o producción. También aspectos prácticos como lo son los consumos diarios o por semana, como también la disposición de estos suplementos en el potrero.

CONSUMOS:

Los consumos diarios dependen de la disponibilidad y calidad de la pastura por lo que los rangos de consumo son amplios teniendo en cuenta los diferentes escenarios y son de utilidad para ver si están dentro de los consumos recomendados.

Es importante que los suplementos siempre estén acompañados de suficiente forraje. Estos productos no son un alimento, son un suplemento por lo que es necesario que los animales puedan lograr un adecuado consumo de fibra en pastoreo o bajo forma de fardos.

Si el consumo es muy elevado al comienzo, dar una sal mineral durante dos semanas previas, con poco fósforo y mucho sodio para eliminar la “PICA” de estos elementos. Luego sí comenzar la suplementación proteica o energética.

Existen zonas en el país con influencia de salitre del mar y suelos con muchos blanqueales, donde sobra el sodio. En esos casos los consumos pueden ser menores pero estar dentro de lo recomendado. En el caso que no lo estén consultar al técnico y evaluar la efectividad de la suplementación.

Para estos casos hay suplementos especiales para sortear inconvenientes.

ENVASE DE CARTÓN:

Los suplementos bajo forma de Bloque vienen acondicionados en envase de cartón y pueden ser perfectamente consumidos por los animales. Salvo el fleje plástico, el suplemento puede ser dejado en el ambiente sin dejar residuos que contaminen. Esto permite tirarlos desde la caja de la camioneta en las zonas donde haya más fibra sin necesidad de andar levantando plásticos por el campo. Si los animales conocen el bloque, se los pueden dejar con cartón y todo que ellos lo abren. En el caso de animales no conocedores, se le quita la cubierta de arriba y se deja la de abajo como mantel.



UREA:

Muchos de los suplementos utilizan urea como fuente de nitrógeno para las bacterias del rumen. Es importante recalcar que la urea no es la agrícola como la conocemos cuando fertilizamos, la urea sufre un proceso de disolución en melaza caliente y en donde la misma se recubre de azúcares que proporciona la melaza. Esto es lo que la hace tan efectiva.

Aumenta la síntesis de proteína microbiana ya que los microbios toman el nitrógeno de la urea y los carbohidratos de la melaza.

Reduce al mínimo el problema de intoxicación ya que la mezcla se hace homogénea y el nitrógeno se utiliza 100 % por el rumen sin entrar en sangre donde es tóxico.

MELAZA:

Los suplementos nuestros utilizan melaza como fuente de energía. La melaza le da al suplemento lo siguiente:

1. Energía rápidamente disponible para los microorganismos del rumen.
2. Modula la utilización de la urea.
3. Aroma y sabor lo que lo hacen bien apetecibles reduciendo la heterogeneidad de los consumos.
Un suplemento poco palatable es un suplemento que muchos animales no lo consumen no cumpliendo el objetivo.
4. Protege al suplemento del lavado por la lluvia.
El suplemento no pierde sabor. Muchos suplementos sin melaza quedan lavados o duros por la lluvia haciendo que los animales los dejen de comer.
5. No desprenden polvo ni se vuelan con el viento.
6. En el caso de los Bloques, la melaza logra esa compactación ideal para lograr un aprovechamiento máximo sin el uso de las bateas.

RANGO DE SUPLEMENTOS:

El objetivo de estos suplementos es cumplir con los requerimientos de los animales en pastoreo en las diferentes épocas del año.

Existen 3 categorías de suplementos:

- Suplementos para mantenimiento
(Limita proteína).
- Suplementos minerales para producción
(Energía y proteína satisfechos).
- Suplementos proteicos y energéticos para producción
(Limita Energía y Proteína).

SUPLEMENTOS PROTEICOS

BLOQUE / LATÓN / SAL PROTEINADA



SUPLEMENTO PROTEICO PARA MANTENIMIENTO

El **Bloque Proteico** es un suplemento utilizado para mantenimiento en la estación de forraje seco. Puede ser en el invierno o el verano.



BLOQUE / LATÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA

Proteína (Mín)	28%
Urea (Máx)	8%
Fibra (Máx)	30%
Humedad (Máx)	16%
Minerales totales (Máx)	40%
Cloruro de sodio (Máx)	20%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	2%

Hierro	208 mg/kg
Manganeso	100 mg/kg
Cobre	25 mg/kg
Cobalto	0.3 mg/kg
Vitamina A (UI/kg.)	12.750
Selenio	0.25 mg/kg
Yodo	1.25 mg/kg
Zinc	100 mg/kg

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- La suplementación proteica en pasturas o rastrojos de baja calidad promueve su consumo al estimular el desarrollo de los micro-organismos del rumen, logrando así un mejor aprovechamiento de la energía disponible en las pasturas.
- Es muy fácil de manejar, no necesita bateas y está pronto para utilizar.
- Tiene el contenido de melaza ideal que lo hace bien palatable y bien consumido.
- Aparte de urea, contiene proteína natural de alta calidad.



INSTRUCCIONES DE USO:

Colocar 1 bloque cada 15 vacunos o 30 ovinos para asegurarse que todos consuman. Se pueden poner directamente en el suelo en un lugar firme y seco.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

OVEJAS	VACUNOS Recrías	VACUNOS Adultos
50-150	150-250	250-400

MAXIBLOCK 35%



SUPLEMENTO ULTRA PROTEICO

El **Maxiblock 35** es un suplemento utilizado para mantenimiento en la estación de forraje seco. Muy similar al Bloque Proteico pero con algunas diferencias destacables:

VENTAJAS:

- Es más concentrado por lo que los consumos pueden ser menores ahorrando costes de transporte.
- En zonas de bajo consumo, permite altas ingestas de nutrientes al ser más concentrado.



INSTRUCCIONES DE USO:

Colocar 1 bloque cada 16 vacunos en zonas con mucha fibra. Los animales consumen el pasto de la vuelta de los bloques. Reponer 1 vez por semana. Para prevenir un sobre consumo en animales hambrientos asegurar abundante fibra y que el bloque siempre esté disponible. Al comienzo el consumo puede ser mayor pero luego se estabiliza.

Si los animales vienen sentidos y con pica, colocar un suplemento mineral alto en sal durante 2 semanas previo al bloque con el objetivo de reducir la pica por falta de sodio.

MAXIBLOCK 35% COMPOSICIÓN | REG N° 15296

Proteína (Mín)	35%
Urea (Máx)	10%
Humedad (Máx)	16%
Calcio (Máx)	5.8 %
Fósforo (Mín)	1.2%
Azufre (Mín)	0.6%
Cloruro de sodio	22%
Manganeso	380 mg/kg
Cobre	97 mg/kg
Cobalto	1 mg/kg
Hierro	150 mg/kg
Iodo	0.3 mg/kg
Zinc	110 mg/kg
Selenio	1 mg/kg
Vitamina A	26.650 UI/kg

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

OVEJAS 30-120	VACUNOS Recría 120-220	VACUNOS Adultos 200-300

BLOQUE TRANSICIÓN FOSFÓRICO 5% / PROTEICO 15%



SUPLEMENTO FOSFÓRICO-PROTEICO PARA PRODUCCIÓN

Este bloque está especialmente recomendado para suplementar vacunos y lanares en épocas de transición de estaciones y pasturas; por ejemplo en el pasaje de invierno a primavera y de otoño a invierno.



BLOQUE TRANSICIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA

Calcio	10%
Fósforo	5%
Magnesio	1%
Proteína Cruda	15%
Cloruro de Sodio	25%
Humedad	12%

Oligoelementos

Hierro	562 mg/kg
Manganeso	900 mg/kg
Zinc	900 mg/kg
Cobre	450 mg/kg
Cobalto	3 mg/kg
Selenio	4.5 mg/kg
Yodo	23 mg/kg

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Está formulado con fosfato monoamónico (MAP). Lo que lo hace un producto único con características exclusivas:
- El amonio es el principal nutriente para las bacterias del rumen.
- El amonio es más palatable que la urea por lo que es mejor aceptado por el ganado en momentos de alta humedad y temperatura con la pastura verde.
- Este bloque nos da la posibilidad de suplementar fósforo en momentos en que es necesario también suplementar proteína. Esto puede suceder tanto en el pasaje de invierno-primavera como en otoño-invierno.

INSTRUCCIONES DE USO:

Colocar un bloque cada 30 vacunos ó 1 cada 60 ovinos.

Se reparten 1 vez a la semana y se colocan en un lugar alto y seco.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

OVINOS 20-50	VACUNOS Vacas de Cría 150	RECRÍAS: 50-100
-----------------	--------------------------------	--------------------

BLOQUE ENERGÉTICO



SUPLEMENTO ENERGÉTICO-PROTEICO PARA PRODUCCIÓN

El **Bloque Energético** es un suplemento utilizado para animales produciendo sobre diferentes tipos de pastura. Aporta energía, proteína de muy alta calidad, minerales y dosifica un ionóforo, la Monensina, que mejora la conversión y actúa como coccidiostato.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Puede ser utilizado en casos extremos en que las pasturas estén secas, bajas en proteína y en bajo volumen.
- La indicación más específica es para suplementar animales que se encuentran en pasturas y verdeos con buena disponibilidad pero aguachentos, aportando proteínas de calidad (bypass), energía y minerales.
- Su uso en otoño sobre terneros recién destetados previene la pérdida de estado, aprontándolos para soportar mejor el invierno.
- En hembras preñadas, utilizado en el último tercio de gestación, se logran prevenir los desequilibrios metabólicos asociados a ese momento.



INSTRUCCIONES DE USO:

Suplementar sobre verdeos, puentes verdes o campo natural. A efectos de regular el consumo reponer los bloques dos veces por semana.

En terneros colocar 1 bloque cada 15 animales y 1 bloque cada 30 ovinos.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

OVEJAS	VACUNOS Recrías	VACUNOS Adultos
150-250	300-500	500-1500

BLOQUE ENERGÉTICO

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA

Proteína (Mín)	15%
Extracto Etéreo	0.25%
Fibra Cruda (Máx)	20%
Humedad (Máx)	16%
Minerales totales (Máx)	18%
Cloruro de sodio (Máx)	10%
Cenizas insolubles al HCL	2%
Hierro	150 mg/kg
Manganeso	100 mg/kg
Cobre	30 mg/kg
Cobalto	0.3 mg/kg
Selenio	0.25 mg/kg
Yodo	1.25 mg/kg
Zinc	100 mg/kg
E. Metabol	8.8 MJ/Kg
E. Metabolizable	200 mg/kg

PROLIQ 330



CONCENTRADO PROTEICO LIQUIDO PARA AGREGAR A FARDOS, RASTROJOS Y PASTURAS SECAS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

● ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SUPLEMENTO:

Melaza, urea, sulfato de amonio, vitaminas y minerales solubles.

● BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

- Suplemento para agregar a fardos, rastrojos y pasturas secas diferida en pie para mejorar su palatabilidad y su consumo.
- Mejora la digestibilidad de fibras de menor calidad.
- Ideal para tambos, feedlots y sistemas extensivos.
- Aumenta el consumo voluntario.



INSTRUCCIONES DE USO:

- Distribuir directamente sobre fardos.
- Utilizar dentro de un bebedero con una tabla flotando embebida en la melaza o lamederos de rueda.
- Para operaciones con mochila, Mezclar el PROLIQ 330 con partes iguales de agua (50:50) y aplicar a la pastura seca y diferida o a los pajonales.
- Se puede mezclar con raciones.

**PROLIQ 330****COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA**

Proteína	33%
Azufre	1,5%
Humedad	35%
Vitamina A	30000 UI/kg.
Zinc	200 ppm
Selenio	1 ppm
Cobre	50 ppm

CONSUMOS RECOMENDADOS

(g/animal/día):

VACUNOS ADULTOS

0,4-0,7

FOSFÓRICO 6% Y 8% BLOQUE / LATÓN



SUPLEMENTO MINERAL PARA PRODUCCIÓN

Los **Bloques Fosfóricos** son suplementos utilizados para vacunos y lanares en producción pastoreando forraje de buena calidad. Son una excelente herramienta para suplementar fósforo en forma práctica y sencilla.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Contiene fosfato monocálcico, melaza, y un bajo contenido de sal.
- Es muy fácil de manejar, no necesita bateas y está pronto para utilizar.
- Mejora el consumo de forraje y por lo tanto el animal produce más.
- En vacas de cría paridas sobre campo natural, repone el fósforo que se pierde a través de la leche y además para atender debidamente el aspecto reproductivo.
- Contiene un amplio rango de minerales, inorgánicos y orgánicos, los que promueven el crecimiento y la producción.

COMPOSICIÓN

	6%	8%
Fosfórico	6%	8%
Humedad (Máx)	12%	12%
Cloruro de sodio (Máx)	15%-20%	18%-23%
Calcio (Máx/Mín)	10%-13.5%	8%-10.8%
Fósforo (Máx/Mín)	5.5%-7.4%	7%-9.5%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	4.5%	4.5%
Hierro	750 mg/kg	850 mg/kg
Magnesio	15.000 mg/kg	1%
Manganeso	600 mg/kg	800 mg/kg
Cobre	150 mg/kg	200 mg/kg
Zinc	600 mg/kg	800 mg/kg
Cobalto	3 mg/kg	4 mg/kg
Selenio	3 mg/kg	4 mg/kg
Azufre	3900 mg/kg	
Yodo	15 mg/kg	20 mg/kg



INSTRUCCIONES DE USO:

Su recomendación más general es en primavera-verano cuando las pasturas están exuberantes y los animales están en plena producción. Cuanto más pasto, mayor consumo de minerales debe de tener ese animal para sostener ese crecimiento.

Colocar 1 bloque cada 25 vacunos o 50 ovinos desparramados por el potrero y reponerlos semanalmente de acuerdo al consumo recomendado.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

	OVEJAS	VACUNOS Recrías	VACUNOS Adultos
6%	50	50-100	100-200
8%	30	40-80	80-120

CIBEL-FOS 4% Y 7%



SUPLEMENTOS MINERALES PARA PRODUCCIÓN

Cibel-Fos es un suplemento mineral utilizado para vacunos y lanares en producción pastoreando forraje de buena calidad. Cuando el forraje es de buena calidad, lo que limita la producción son los minerales especialmente el Fósforo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Contiene Melaza por lo que asegura la palatabilidad y que no se vuele. Una vez mojada la sal, no se forman costras que impidan al animal lamer el suplemento.
- Contiene fosfato monocalcico.
- Mejora el consumo de forraje y por lo tanto el animal produce más.
- En vacas de cría paridas sobre campo natural, mejora la preñez y sobre todo la calidad de la preñez reduciendo el intervalo parto-concepción.
- Contiene una importante cantidad de Magnesio, Cobre, Zinc y Selenio, deficientes en la mayoría de nuestros suelos.



INSTRUCCIONES DE USO:

Su recomendación más general es en primavera-verano cuando las pasturas están exuberantes y los animales están produciendo bien.

Cuanto más pasto, mayor consumo de minerales debe de tener ese animal para sostener ese crecimiento.

COMPOSICIÓN

Fosfórico	4%	7%
Humedad (Máx)	12%	12%
Calcio	14% - 18%	9% - 11%
Fósforo	4%	7%
Magnesio	1%	1.5%
Cloruro de sodio (Máx)	20% - 40%	20% - 40%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	4.5%	4.5%
Manganeso	0.75%	1%
Yodo	15 mg/kg	30 mg/kg
Cobalto	2 mg/kg	4 mg/kg
Zinc	600 mg/kg	1200 mg/kg
Hierro	400 mg/kg	750 mg/kg
Selenio	3 mg/kg	6 mg/kg
Cobre	300 mg/kg	600 mg/kg

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

	OVEJAS	VACUNOS Recrías	VACUNOS Adultos
7%	15	30-80	50-120
4%	30	40-80	80-120

BLOQUE RECRÍA | DESTETE

El **Bloque Recría** ha sido especialmente desarrollado para suplementar terneros desde el destete y durante su primer año de vida.

Esta indicado para pasar el primer invierno y el primer verano sobre campo natural. Al ser una suplementación sobre terneros, la eficiencia de conversión del suplemento a kilos de ternero es de las mejores arrojándose a valores de 2 a 1 con un costo beneficio muy bueno.



BLOQUE RECRÍA COMPOSICIÓN

Proteína	25%
Humedad	16%
NaCl	15%
Calcio	2.6%
Fósforo	0.8%
Magnesio	0.5%
EM(MJ/Kg.)	8.8%
Hierro ppm	416%
Manganeso ppm	200%
Zinc ppm	200%
Cobre ppm	50%
Cobalto ppm	0.6%
Selenio ppm	0.5%
Yodo ppm	2.5%
Vit A(UI/Kg.)	25.500%

Es ideal para pasar de una racionada en forma diaria y con mucha ración, a una suplementación con bloques. De esta manera el costo diario se mantiene, pero se hace en forma práctica sin necesidad de bateas ni dar en forma diaria.

MODO DE USO

Destete a corral:

Para el momento del destete, se recomienda dejar los terneros encerrados con sombra y agua y ahí poner los bloques a razón de 1 bloque cada 25 terneros.

- **A los 4 días** ya se pueden poner los bloques a razón de 1 bloque cada 14 terneros.
- **Al día 4** ya los terneros dejan de buscar a las madres y se pueden largar al campo poniendo los bloques en un rincón del potrero y arrojándolos todos los días unos 20 min. Si el productor dispone de fardos, poner no más de 1 kilo de fardo por ternero por día ya que el objetivo es promover el consumo del bloque.

Destete alambrado por medio:

En el caso de dejar los terneros, alambrado por medio de las madres, los bloques se colocan sobre el alambre para que al costear los terneros ya reconozcan el gusto a la melaza y rápidamente empiecen a comer el suplemento.

- **Al día 7** ya las vacas no costean y se pueden llevar las mismas lejas de los terneros a otro potrero.

CONSUMOS RECOMENDADOS

El consumo diario va de **300 a 600** gramos día y la asignación de bloques se hace **2 veces por semana** y se repone una vez consumido, siempre dejando un bloque **cada 14 terneros** para que no exista competencia entre ellos. Siempre es preferible repartir los bloques donde pastorean los terneros y bien distribuidos en el potrero.

CREEP FEEDING

SUPLEMENTO ENERGÉTICO-PROTEICO PARA PRODUCCIÓN

El **Bloque Creep Feeding** es un suplemento utilizado para terneros al pie de sus madres. Cuando el ternero tiene cierto desarrollo, se arma un corral para que solamente ingrese el ternero a comer el bloque. Este bloque permite un desarrollo más temprano del rumen mejorando los pesos al destete.

VENTAJAS Y USOS:

- Fácil de implementar, poca infraestructura. Basta con armar un corral para que entre solamente el ternero
- No necesita techo, la melaza protege al bloque de la lluvia.
- Con un simple acostumbramiento de 1 día a corral más el bloque, el ternero reconoce el bloque y luego aprende a comerlo enseguida.
- No contiene urea.
- Contiene Monensina que mejora la conversión y protege de coccidiosis a los terneros.
- Con la dosis diaria recomendada el ternero recibe 2 gramos/día de cultivo de levaduras.
- Contiene energía en base a grasas by pass.



INSTRUCCIONES DE USO:

Armar un corral de 3 x 3 o similar cada 60 terneros. Colocar 1 bloque la primer semana. Afuera del corral colocar el Bloque Fosfórico para la vaca.

Es conveniente que los terneros pesen 70 kg o más al comienzo. Armar el corral en lo posible en la sombra, que es donde frecuentan más los terneros o cerca del agua.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

TERNEROS
50-180

CREEP FEEDING

COMPOSICIÓN (REG N° 16467)

Proteína Cruda (Mín)	21%
Humedad (Máx)	16%
Calcio (Máx)	1.5%
Fósforo (Mín)	0.75%
Cloruro de sodio	6%

Manganeso	200 mg/kg
Cobre	50 mg/kg
Cobalto	0.6 mg/kg
Hierro	416 mg/kg
Iodo	2.5 mg/kg
Zinc	200 mg/kg
Selenio	0.5 mg/kg
Energía (MJ EM/Kg)	10.5 mg/kg
Vit A (UI/Kg)	25.500 mg/kg

Contiene medicamentos

BLOQUE FLUSHING

SUPLEMENTO PROTEICO-ENERGÉTICO PARA PRODUCCIÓN

El **Bloque Flushing** es un suplemento que aporta proteína de alta calidad para aumentar la tasa ovulatoria y así aumentar la tasa de preñez y el porcentaje de mellizos.



BLOQUE FLUSHING

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

Composición en base fresca o tal cual

Proteína (NxF) (Mín)	30%
Humedad (Máx)	16%
Fibra cruda (Máx)	20%
Cenizas totales (Máx)	20%
Cenizas totales (Máx)	20%
Cloruro de sodio (Máx)	8%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	2%

Minerales adicionados

Manganeso	100 mg/kg
Yodo	1.25 mg/kg
Cobalto	0.3 mg/kg
Zinc	100 mg/kg
Hierro	208 mg/kg
Selenio	0.25mg/kg
Cobre	25 mg/kg

Vitaminas adicionadas

Vitamina A	12750 UI/kg
------------	-------------

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Muy palatable por lo que las ovejas lo aprenden a comer rápidamente incluso en sistemas bien extensivos.
- Contiene mucha energía y proteína by pass que es el nutriente más limitante para aumentar el reclutamiento folicular y disminuir la atresia.
- Mejora la resistencia a parásitos y complementa de forma excelente el control con las drogas.
- Contiene alto contenido de Zinc para lograr pezuñas más fuertes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Comenzar la suplementación en ovejas 16 días previo al ingreso de los carneros y seguir hasta 16 días después. Si las ovejas nunca comieron bloque, comenzar antes con el acostumbramiento.

Colocar 1 bloque cada 25 ovinos y reponer dos veces a la semana según el consumo recomendado.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

OVEJAS

150-300

BLOQUE PERIPARTO

SUPLEMENTO PARA PRODUCCIÓN

El **Bloque Periparto** es un suplemento utilizado para ovejas en el término de la gestación y prontas para parir, ya que el campo natural no logra satisfacer los requerimientos de ovejas en el último tercio de gestación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Muy palatable por lo que las ovejas lo aprenden a comer incluso en sistemas bien extensivos.
- Contiene mucha energía que es el nutriente más limitante.
- Aumenta el peso al nacer de los corderos.
- Mejora la fluidez del calostro y su cantidad. La glucosa de la melaza es lo osmóticamente activo en la ubre y es lo que deja al calostro fluído para ser rápidamente succionado por el cordero.
- Previene toxemia de preñez en gestaciones avanzadas.



INSTRUCCIONES DE USO:

Ofrezca el bloque 30 días antes del parto. Si realiza esquila preparto aproveche ese momento para comenzar a usar los bloques.

Se coloca un bloque para 25 ovejas. Si las ovejas nunca comieron ración es conveniente durante la primera semana realizar un acostumbamiento para luego repartirlos en el potrero.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

OVEJAS GESTANDO

150-300

BLOQUE PERIPARTO COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA

Proteína (Mín)	13%
Urea (Máx)	2%
Fibra (Máx)	20%
Humedad (Máx)	16%
Minerales totales (Máx)	20%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	2%
Cloruro de sodio (Máx)	15%
Hierro	208 mg/kg
Manganeso	100 mg/kg
Cobre	25 mg/kg
Cobalto	0.3 mg/kg
Selenio	0.25 mg/kg
Yodo	1.25 mg/kg
Zinc	100 mg/kg
Vit A	12750 UI/Kg
E. Metabolizable	100 mg/kg

BLOQUE EQUINOBLOCK

SUPLEMENTO PROTEICO-ENERGÉTICO PARA EQUINOS

Es un bloque diseñado para equinos en todas sus categorías y su objetivo es aportar energía, proteína, minerales orgánicos, vitaminas y levaduras.



BLOQUE EQUINOBLOCK

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO

Composición en base fresca o tal cual

Proteína (NxF) (Mín)	14%
Humedad (Máx)	16%
Fibra cruda (Máx)	20%
Cenizas totales (Máx)	30%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	2%
Cloruro de sodio (Máx)	15%

Minerales adicionados

Manganeso	75 mg/kg
Yodo	0.3 mg/kg
Cobalto	0.3 mg/kg
Zinc	135 mg/kg
Hierro	120 mg/kg
Selenio	0.7 mg/kg
Cobre	38 mg/kg

Vitaminas adicionadas

Vitamina A	7500 UI/kg
Vitamina D	1500 UI/kg
Vitamina E	150 UI/kg
B1	15 mg/kg
B2	15 mg/kg
B6	7.5 mg/kg
Biotina	225 mcg/kg
B12	30 mcg/kg
Colina	375 mg/kg
Potasio	3%

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Contiene Biotina, Levaduras y Zinc orgánico con el objetivo de mantener el pelo brillante y los cascos fuertes.
- Contiene alta concentración de Sodio y Potasio, que se pierden con el sudor en los momentos de alta exigencia.
- Contiene alta concentración de energía y proteína de calidad. Esto permite lo siguiente:
- Mantener masa muscular en momentos de poca oferta de alimento de calidad.
- Mejora la cría de los potrillos una vez destetados.
- Aporta selenio orgánico e inorgánico para optimizar el desarrollo osteoarticular del potrillo.
- En yeguas previo al parto para lograr una correcta lactancia y criar un buen potrillo.

INSTRUCCIONES DE USO:

El bloque se coloca directamente en el campo sin necesidad de bateas. Se recomienda colocar 1 bloque cada 7 equinos y reponer de acuerdo al consumo recomendado.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

POTRILLOS	EQUINO Adultos
500	500-1500

No permitir consumos superiores a los recomendados. Regular el consumo con la reposición de los bloques.

NUCLEO PROTEICO | SB500

CONCENTRADO PROTEICO PARA MEZCLAR CON GRANO

El SB 500 es un concentrado proteico, vitamínico y mineral que se utiliza para mezclar con granos y así formular una ración balanceada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Es muy concentrado en nutrientes lo que permite una baja inclusión y así ahorrar costos de flete y manejo.
- Contiene urea que va disuelta en la melaza asegurando una excelente homogeneidad de la mezcla.
- Aparte de urea, contiene proteína vegetal de altísima calidad.
- Contiene moduladores de pH ruminal e intestinal para evitar acidosis.
- Contiene monensina lo que permite mejorar la conversión, prevenir timpanismo y acidosis.



SB500

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUANTITATIVA

Proteína (Mín)	49%
Humedad (Máx)	16%
Vitamina A	46.000 UI/kg
Fibra Cruda (Máx)	8%
Minerales totales (Máx)	35%
Cenizas insolubles al HCL (Máx)	3,5%
Cloruro de sodio (Máx)	5%
Monensina sódica	300mg./kg
Manganeso	166,7mg./kg
Yodo	3,3mg./kg
Cobalto	3,3mg./kg
Zinc	250mg./kg
Hierro	250mg./kg
Selenio	2,3mg./kg
Cobre	83,3mg./kg
Urea (Máx)	15%

INSTRUCCIONES DE USO:

Con grano seco (maíz o sorgo) 90% grano + 10% de SB500.

Para grano húmedo (mas de 22% de humedad) la proporción deberá ser del 8%.

Es importante ajustar la oferta de la mezcla en función de su materia seca.

CONSUMOS RECOMENDADOS (g/animal/día):

Va a depender de la cantidad de grano a consumir.
Nunca dar el producto puro.

FIPROTOP PLATA SPRAY

Curabichera triple acción. Larvicida, cicatrizante y antimicrobiano.



PRINCIPIO ACTIVO: Fipronil 0,7%,
aluminio micronizado 7%.

VÍA DE APLICACIÓN: Tópica en aerosol.

DOSIS: Rociar completamente la herida.

PRESENTACIÓN: 300 mL, 600 mL.



TIEMPO DE ESPERA:

CARNE:

50 días

LECHE:

No usar en equinos para abasto, ni en vacas cuya leche tenga destino humano.

MANTENGASE ACTUALIZADO EN NUESTRAS LINEAS DE TRABAJO



CIBELES AGRO



CIBELES VETERINARIA



Oficina Central: 12 de Diciembre 767
Tel.: (+598) 2209 1001 | C.P. 11800 / Montevideo, Uruguay.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26 (Joaquín Suárez)
Tel.: (+598) 2288 8530 / 31 / Canelones, Uruguay.

www.cibeles.com.uy